


Др. МИХАЙЛО КОС

ПРО ПОЛОВІ СПРАВИ

Пяте змінене виданє
З ОБРАЗКАМИ.




ВІННІПЕГ, МАН. 1922.

*Накладом Української Книгарні
850 Main St., Winnipeg, Man*

**З друкарні "Канадийского Фармера"
120-122 King Street. — Winnipeg, Man.**

ЗБІРКА
ІВАНА ЛУЧКОВА




ВСТУПНЕ СЛОВО.

Полові справи заскакують молодіж без ніякого знання і приготування до сеї дуже важної хвилі в життю; молодіж, як хлопці так дівчата, зовсім не поучена, в чім лежить суть полового дозрівання, який спосіб природного заспокоювання полових почувань і які заходять притім небезпеки з огляду на полові заразливі хвороби; також не поінформована яка шкода для тіла, коли заспокоює ся полові почування неприродним способом. Сьому винен наш погляд на виховане молодіжи, що наказує держати її у несвідомости про полові справи з уваги на соромливість і моральність. Моралісти вважають за неморальну річ навіть предметово поучити молодіж про природні (фізіологічні) прояви в життю людського (і звіринного) організму з обсягу полових справ. Натуралісти зі своєю засадою, що природні справи не погані, не мають приступу до офіційального виховання молодіжи. І виходить із того таке, що про полові справи мовчить ся дома і в школах, наче би їх зовсім не було; мовчки полишає ся молодіжи, щоби вона здобувала собі інформації про полове жите організму на власну руку. І молодіж, приневолена в своїм часі половими почування, розвідує ся про полові справи майже без виїмку з непевних жерел, тай ще до того понайбільше з нечистих жерел, за дуже дорогу оплату, бо за полову заразливу недугу, з якою знов не знає що почати.

Було би пожадано, щоби молодіж інформувала ся про полові справи в відповідну хвилю, в офіційній шко-

лі, головню від шкільних лікарів, яких треба би в тій ціли установити по школах.

Отсі стрічки мають на увазі головню молодіж і ставлять собі за задачу подати їй найпотрібніші відомости про полові відносини, щоби вона в хвили полового дозрівання мала в руці бодай коротке, але предметове представлене природних проявів, що дотикають полових органів. Рівночасно має отсе письмо виповнити прогалину в шкільних книжках, де описуєсь людське тіло, а при тім усе опускаєсь полові части тіла. Се пропускане полових органів у шкільних книжках має свою причину і не мені судити про неї. Коли в дальших стрічках описуєть ся полові части тіла, то діє ся се єдино в ціли поученя, в ціли доповнення шкільної науки, про те в чистій ціли і зовсім ясній кождому розумному. Хто думавби іначе і схотів би шукати в отсім письмі приперченої (пікантної) лектури, той ліпше зробить, коли отсеї книжочки не буде читати.



I. АНАТОМІЯ ПОЛОВИХ ЧАСТИЙ ТІЛА.

Поговорім найперше про будову полових частий тіла (анатомію) у мужчини і жєнщини таї про призначєне і діланє (фізіольогію) поодиноких частий полових органів.

а). У мужчини.

Долїшня часть черевної ями, обнята бедровими кістями, крижовою костью і хвостовою костью називає ся лоханею. Бедрова кість кожного боку складає ся з трох частий, а саме з клубової кости, соромної кости і сїдальної кости. Де ті три кости зростають ся, там на їх внішнім боці є ямка для приміщеня головки удової кости. В лохани і її найблизшїм сусїдстві містять ся полові части тіла (пор. образок 1).


Головною прикметою мужчини є дві залози, звані яйцями, де витворює ся мужеське сїмя. Яйця (пор. образок 2) уміщені в шкірянім мішку, званім мошнами, який вистелений підшкірною верствою гладких мязових волокон, званою “тунїка дартос”. Мошна розділені осїбною стїнкою на лїву і праву половину, для поміщеня лївого і правого яйця. Лїва половина мошен звисає звичайно трошка низше, як права і лїве яйце стоїть трошка низше, як праве. Мужеське яйце має вид і величину голубячого яйця, воно складає ся з великого числа рурочок, чи там каналиків, де витворює ся мужеське сїмя. Ті каналики сплїтають ся зі собою, а остаточно виходить лиш кільканайцять каналиків крізь задню стїну болонки, що обгортає саме яйце.

Поза яйцем сплїтає ся зі собою тих кільканайцять каналиків поновно і творить прияїче, що лежить при задній стїні яйця; само яйце стоїть довшою своєю осею з го-

ри на діл, прияйче прилягає поздовж до яйця і творить із яйцем одну цілість. Прияйче грає велику ролю при трипрівій хоробі мочевої цівки, бо то воно запалює ся під впливом трипрової зарази, і загально знана ся болюча хороба під назвою запалення яйця, хоч дійсно се запалене прияйча. Прияйче грубше в своїй горішній части, а чим дальше в долину тим менше воно обемисте, аж у кінци переходить в оден — одинокий провід сімени, який веде від долішного кінця прияйча в гору, щоби через пахвиновий канал в черевній стіні дістати ся до черевної ями. Разом із сіменним проводом маємо між яйцем а пахвиновим каналом іще кровоносні судини, нерви і властивий мяз, що підносить яйце, а все те зібране разом творить сіменний мотузок, який можна вимацати крізь шкіру в мошнах. При сильнійшій стисненню сіменного мотузка між пальцями відчуває осматрюваний мужчина властивий біль, що походить від нервів, обнятих у сіменнім мотузку. Також при натисканню на мужеське яйце відчуває мужчина властивий, а дуже діткливий біль так, що по нїм можна добре відрізнити мужеське яйце від можливої хоробливої нарости, чи гуза в мошнах і околиці пахвинового каналу. Кровоносні судини йдуть у сіменнім мішку в двох напрямках, а то: артерії (бючки), що доводять свіжу кров, йдуть із черевної ями до яйця, отже з гори в долину; зужита кров виходить із яйця до гори, до черевної ями.

Пахвиновий канал лежить у черевній стіні і пробиває скісно черевні мязи, яких є три верстви. Той кінець пахвинового каналу, де входить сіменний провід лежить близше середньої лінії тіла. Дальше біжить пахвиновий канал на внї від середини тіла, а в нїм сіменний провід разом зі своїми кровоносними судинами і нервами і входить до черевної ями, де вже відлучують ся кровоносні судини і нерви від сіменного проводу. Кровоносні судини і нерви йдуть до більших своїх пнів, а сіменний провід подає ся до долішної стіни мочевого міхуря, де лежить сіменний міхурець, призначений на те, щоби там


збирало ся на запас мужеське сімя, витворене в яйцях і доведене сюда сіменними проводами. Лівий і правий сіменний міхурець получений з сіменним проводом свого боку і підчас полової злуки виходить сімя до сіменного проводу, який переходить далше через крокову залозу до мочевої цівки. Часть сіменного міхурця аж до входу в мочову цівку, називає ся проводом до виприскування сімени, бо мужеське сімя не впливає з него підчас полової злуки одностайно та рівно, але випискає то сильнійше то слабше. Крокова залоза має вид і величину каштана, зверненого грубшим кінцем до гори, а тоншим на діл. Крізь крокову залозу переходить мочова цівка зараз по виході з мочевого міхуря і то так, що мочова цівка лежить близше передньої поверхні, а з заду мочевої цівки лежить більша часть крокової залози. І крізь ту задню грубшу часть крокової залози пробиваєть ся провід до виприскування сімени скісно з заду і гори на перед і діл тай входить у тім самім напрямі в мочову цівку. Лівий і правий провід сімени має в мочовій цівці осібний вхід, а межі обома вхідними пунктами лежить сіменний горбочок (пор. образок 3), чи там троха грубший фалд слизної болони. По обох боках сіменного горбочка лежить по кілька усть проводів, що доводять сюда витвір крокової залози, який лучить ся підчас полової злуки з мужеським сіменем і разом із ним виприскує із мочевої цівки до похви женщины. Мочовий міхур лежить із заду за соромними кістями в лохани; до мочевого міхуря спливає моч з двох нирок, що лежать в околиці крижий, через два мочоводи, а ті входять до мочевого міхуря, пробиваючи скісно його задню стіну. Моч спливає мочоводами безнастанно, збирає ся в мочовім міхури, а коли назбирає ся в більшій скількості, міхур відчуває потребу віддати її. Віддаване мочи залежить від волі чоловіка; тоді нати-скають стіни міхуря на моч і випихають її крізь мочову цівку на двір. В стінах міхуря лежать гладкі волокна мязові і вони то мають здібність стягати ся і так сильно на-пирати на моч, щоби її видалити.



Образок 1.

Лохань.

1. Os ilei. 2. Os sacrum. 3. Os coccygis. 4. Caput ossis femoris. 5. Os pubis. 6. Os ischii.
 7. Tuberositas ossis ischii. 8. Arcus ossium pubis. 9. Symphyss ossium
 pubis. 10. Os femoris.




Образок 2.

**Шематичний перекрій мужеських полових частий тіла
з переду в зад.**

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Peritoneum. | 8. Ductus deferens. |
| 2. Vesica urinaria. | 9. Epididymis. |
| 3. Vesicula seminalis. | 10. Testis. |
| 4. Prostata. | 11. Scrotum |
| 5. Ductus ejaculatorius. | 12. Corpus cavernosum penis. |
| 6. Vesicula prostatica. | 13. Corpus cavernosum urethrae. |
| 7. Glandula bulbourethralis
(Cowperi). | 14. Urethra. |
| | 15. Symphysis ossium pubis. |

Мочова цівка довга на 15 до 17 см., починає ся в долішній часті міхуря, а кінчить ся внішнім отвором в головці мужеського члена. Самий початок мочної цівки коло міхуря переходить через крокову залозу, обнятий нею зі всіх боків і називає ся кроковою частію мочної цівки. Коли крокова залоза задля запалення, скалїчення або тиснення якого повотвору і т. п., побільшить ся, то тисне на мочову цівку, а часом і цілком її стискає так, що моч не може відпливати з мочового міхуря і треба конче лікарської помочи, щоби випустити її на вні. Понизше крокової часті мочної цівки йде так само довгий кусень цівки, необнятий нічим, а найвузший з цілої цівки. Вся дальша часть мочної цівки окружена ямистим тілом, в якім є ями, що можуть наповнювати ся кровю. Ямисте тіло мочної цівки починає ся там, де вона переходить попід місцем зросту обох соромних костий і буває тутки грубше ніж у дальшій перебігу та називає ся “булбус уртрае”, сама-ж мочова цівка в тім місци троха розширена. В тій часті мочної цівки вливають ся проводи двох невеличких мов горох, залоз, що лежать позаду свободної часті мочної цівки і долучають свій витвір до сімени виприскуваного підчас полової злуки. Дальший перебіг мочної цівки в ямистім тілі не представляє нічого особлившого, аж перед самим внішнім отвором розширяє ся мочова цівка незначно і ся часть називає ся лодковою, а звісна вона з того, що тут осїдає триповий заразок підчас зараження трипром і тутки почуває хорий найперше, що запалена слизна болоне пече і виділяє білявий гній. Ямисте тіло мочної цівки грубіє при внішнім кінці цівки значно і творить головку мужеського члена, покриту подвійним листком шкіри, званім залупою. Залупу можна кого члена полову розкіш підчас полової злуки, а головпоказує ся покрита ніжною скіркою, дуже вразливою на подразнення, дотиканє і потиранє, бо в ній приміщені велими ніжні нерви, які грають головну роль при половім подразненю так, що мужчина почуває в головці мужеського члена полову орзкіш підчас полової злуки, а голов-

Шематичний перекрій мужеського члена з лівого боку
в правий бік.



- 1 Ureter.
2. Устє vesicae prostaticae.
3. Pars prostatica.
4. Pars membranacea.
5. Устє ductus prostatici.
6. Pars cavernosa.
7. Corpus cavernosum urethrae.
8. Corpus cavernosum penis.
9. Glans penis.
10. Praeputium.
11. Fossa navicularis.
12. Orificium cutanlum.
13. Corona glandis.
14. Sulcus retroglandularis.
15. Устє glandulae Cowperi.
16. Pars bulbosa.
17. Устє ductus ejaculatorii.
18. Prostata.
19. Colliculus seminalis.
20. Устє мочовода.

Образок 3.

но підчас спусканя сімени. Головка мужеського члена має на заднім краю згрубілий вал, а за ним є ровик, де в шкірі приміщені дрібні залози, що витворюють лойовату масу, яку має властивий собі запах. На долішній часті головки прикріплена залупа до головки привязкою так, що тут залупи не можна відтягнути цілковито поза головку, бо привязка не пускає. При половій злуці грає привязка дуже часто прикру ролю, бо при наглім і безогляднім вводиттю мужеського члена до похви, розриває ся привязка, або бодай наддирає ся, а в так повсталу ранку може увійти заразок полових недуг без перешкоди. Часом трапляє ся, що залупа звужена на краю і не дає себе стягнути з головки. Те звуженє залупи може бути причиною запаленя головки, бо чищенє головки стає неможливе, особливо, коли дістануть ся під залупу хоробові заразки. Нераз буває так, що звужена залупа дасть ся з трудом стягнути з головки, але зараз же запне ся за головою і не дасть ся зтягнути назад. Сей стан називаємо “парафімосіс” і він також прикритий, бо парафімосіс угнітає мужеський член, доводить до опухнення головки і нерідко доходить до того, що жива тканина на стисненім місці завмирає...

Мужеський член складає ся побіч ямистого тіла мочної цівки, ще з двох ямистих тіл властивих, що прирослі до тої галузи сідальної кости, яка йде від сідального гуза до соромної кости. Під місцем зросту соромних костий стикають ся оба ямисті тіла мужеського члена, а в рівчику між ними обома, на долішній стороні, укладаєсь ямисте тіло мочної цівки. Всі три ямисті тіла, злучені зі собою злучною тканиною і заосмотрені доводячими і відводячими кровоносними судинами тай нервами, творять мужеський член. Ямисті тіла мають у собі ями, чи там простори, де може назбирати ся багато крови, а коли її відплив здержить ся відповідними запорами, тоді ямисті тіла набирають більшого обєму і твердості так, що мужеський член може бути введений в похву женщины. Такий стан напруженя мужеського члена називає ся



Образок 4.

Перекрій матиці з лівого боку на правий бік.

1. Fimbriae. 2. Tuba Falloppiae. 3. Fundus uteri. 4. Ostium uterinum tubae. 5. Cavum uteri. 6. Orificium internum uteri. 7. Orificium externum uteri. 8. Pars vaginalis uteri. 9. Canalis cervicis. 10. Plicae palmatae. 11. Corpus uteri. 12. Ligamentum ovarii. 13. Ligamentum teres. 14. Ovarium. 15 Ostium abdominale tubae.

“ерекцію”. Перебіг мужеської мочної цівки в стані напруження мужеського члена має лиш одно вгнуте звернене до гори там, де вона переходить попід місце зросту соромних костий, внішний отвір мочної цівки звернений наперед і трошка до гори. В стані супочинку звернена більша частина мужеського члена зі своїм внішнім отвором в долину, через яку мочова цівка дістає друге вгнуте місце там, де вийшла з під зросту соромних костий. Вгнутість сього місця звернена назад і в долину.

Місце, де в середній лінії тіла зростають ся соромні кости обох боків, і їх найблизшу околицю, покриває шкіра, у полово дозрілих осіб поросла волосем, а що воно трохи піднесене понад сусідство, то називає ся горбком Венери.

б). У женщин.


Ціхою женського пола є яєчник (пор. образок 4), залоза, що витворює людське яєчко. Яєчників є два, лівий і правий: прикріплені вони до лівого і правого боку матиці власними привязками. Яєчники і матиця приміщені в лохани. Яєчник є величини великого бобового зерна, тоншим кінцем звернений до матиці і тим кінцем привязаний до неї своєю привязкою. Коли яєчко дозріє в яєчнику, то лускає тоненька болонка яєчка на тім місці і яєчко дістає ся з яєчника до тої часті черевної ями що обнята бедровими кістями. Щоби яєчко дістало ся до матиці, на те призначена цівка (трубка) “Фальльопія”, так названа від імени наслідувача анатома, що її найперше описав, а приміщена понад яєчком. Трубка одним кінцем впадає до матиці, а другий кінець близько яєчника, але до нього не припирає. Сей кінець троха розширений і заосмотрений на берегах торочками. Як зріле яєчко вийшло з яєчника, тоді торочки обхоплюють його, вводять у трубку “Фальльопія” і проводять до середини матиці.

Матиця лежить у лохани, з виду подібна до трохи

сплющеної грушки, величини доброї сливки або невеликої грушки. Грубшим кінцем звернена до гори, а вузшим на долину. Матиця сплющена з переду до заду. Горішня частина матиці творить властиве тіло, а долішня видовжена називає ся шийкою матиці. Сама верхня частина тіла матиці найширша і називає ся підставою. Долішня частина сторчить до похви і називає ся похвовою частиною матиці. В середині матиці є простір, що має вид трикутника на поперечнім перекрою матиці з лівого боку до правого. В обох горішніх кутах трикутника впадають до матиці рурковані проводи від яєчників, звані трубками “Фальлопія”; долішний кут трикутника має також отвір, що веде до похви через шийку матиці.

Каналом шийковим матиці називає ся той видовжений провід у долішнім куті матичного простору що веде до похви. Середина матиці вистелена слизною оболонкою, котра в шийковім каналі має поперечні зморщкі. Устє шийкового каналу до похви (пор. образок 5), обняте троха згрубілим, гладким берегом похвової частини матиці, на яким відріжняємо передню і задню губу. Але губи похвової частини матиці гладкі лишень у дівчат і жінок, що не родили. Коли жінка родила, то видно зморщкі на похвовій частині матиці. Стіни матиці зложені головню з гладких волокон мясних. (Звичайні м'язи, пр. ті, що згинають по нашій волі руки або ноги звані в звичайнім життю мясом, мають поперечні пружки і називають ся пружковатими). Гладкі волокна ріжняться тим від поперечно пружковатих, що вони стягають ся, коли їх житєва задача того вимагає, а не тоді, коли чоловік хоче. Протівно задача поперечно пружковатих м'язів залежить від волі чоловіка. М'ясні волокна матиці мають здібність незвичайно розростати ся коли того потреба. А така потреба заходить підчас вагітності, де об'єм матиці доходить до величини більшої ніж голова у дорослого чоловіка, коли протівно звичайно вона так велика, як мала грушка.

Матиця прикріплена до стін лохані двома широкими



Образок 5.


Шематичний перекрій жіночих полових частий тіла з переду в зад.

1. Tuba Fallopieae. 2. Fimbriae. 3. Ovarium. 4. Labium posterius. 5. Orificium externum uteri. 6. Labium anterius. 7 Vagina. 8. Urethra. 9. Glandula vestibularis major (Bartolini). 10. Labium majus. 11 Labium minus. 12. Clitoris. 13. Symphysis ossium pubis. 14. Peritoneum. 15. Vesica urinaria. 16. Corpus uteri. 17. Fundus uteri.

привязками і двома мотузковатими привязками. Ті чотири привязки, дві з лівого, а дві з правого боку, разом із м'язами, що творять дно лохані, піддержують матицю в правильнім положенні посеред лохані. Ціла матиця разом з яєчниками і трубками “Фальльопія” покрита зверху (від сторони черевної ями) гладкою тонкою болоною, яка покриває і всі інші твори в черевній ямі, як кишки, печінку і т. д. Ся очеревна болонка бере уділ у хворобах матиці, а для нас особливо важне її запалення при триприві зараженню полових органів жінки, бо запалення очеревної в локані дуже болюче і руйнує здоров'я в високій степені. Покхвова частина матиці обнята горішньою частиною покхви.

Покхва, що тягне ся від долішньої части матиці до внішнього свого входу (пор. образок 6), довга на 8 до 10 см., і вистелена слизною болоною, уложеною в багато попережних зморщків. О ті попережні зморщки потирає ся підчас полової злуки ніжна шкірка на головці мужеського члена і дізнає більшого полового подразнення. Внішний вхід до покхви у дівчат частинно заставлений дівочою болоною, яка однаково полишає ще доволі місця, щоби кров із матиці підчас місячки могла свобідно на вні відпливати. Дівоча болонка се властиво фалд слизної болони покхви і раз більше раз менше розвинена. Дівоча болонка проридрає ся звичайно підчас першої полової злуки з мужчиною через введення мужеського члена в стані напруження до покхви. Сей акт полочений з болем і впливом крові з роздертої болони дівочої; вона ще більше розидрає ся при породах дітей і опісля остають із неї на дальше жите гейби покарбовані останки.

Внішні полові або соромні части у жінки творять дві пари губ. Великі губи прорстягають ся від горбка венери аж до межикроча т. є тої части шкіри, що лежить межі долішнім кінцем жіночого сорому а отвором задної кишки. Великі губи, се фалди шкіри, пророслі волосем у полово дозрілих, на границі межикроча полочені зі собою привязкою, за якою робить ся мала дучка або заглу-



Образок 6.

Внішні полові части тіла у дівчини.

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| 1. Commissura labiorum anterior.. | 8. Fossa navicularis. |
| 2. Glans clitoridis. | 9. Hymen fimbriatus. |
| 3. Frenulum clitoridis. | 10. Labium minus. |
| 4. Ostium vaginae. | 11. Orificium urethrae. |
| 5. Устє glandulae Bartolini. | 12. Vestibulum vaginae. |
| 6. Frenulum labiorum. | 13. Labium majus. |
| 7. Commissura labiorum posterior. | 14. Praeputium clitoridis. |

блене, де звичайно збирається гній хорої похви, коли вона заражена трипровою хворобою. Великі губи обох боків стикаються зі собою, а борозда на місці зіткнення називається соромною бороздою. Великі губи прикривають собою малі губи, які мають легко покарбовані береги, не мають поросту і є цілком гладкі. Долішні кінці малих губ гублять ся по обох боках входу до похви, а горішній кінець кожної малої губи ділиться на дві галузки, з яких долішні галузки, доходять до розкішниці і творять так звану привязку розкішниці, а горішні галузки лучать ся зі собою і творять так звану залупу розкішниці. Сї назви відповідають назвам на мужеськім члені, бо розкішниця вважає ся за нерозвинений мужеський член. Розкішниця складає ся з двох ямистих тіл, які відповідають обом ямистим тілам мужеського члена, тільки не так сильно розвинених. Вони лучать ся з собою, творять на своїм переднім кінці частинну головку і та головка розкішниці дізнає підчас полової злуки анальогічного почуття розкоші, яке відчуває мужчина в головці свого мужеського члена. Простір межи розкішницею і входом до похви називає ся передсінком похви і жіноча цівка мочова має тутки своє устє, значить воно відділене від обох ямистих тіл, які творять розкішницю, коли противно у мужчини мочова цівка зі своїм ямистим тілом прилучена до обох ямистих тіл мужеського члена і творить одну цілість. По обох боках передсінка похви лежить багато сплетених жил, що підчас полового побудження або полової злуки наповняють ся обильно кровю і творять також органи розкоші у жєнщини.

По обох боках входу до похви мають своє устє залози, що витворюють лойовату масу о властивім запаху, а відповідають своїм значінем відповідним залозам у мужчини. Мочовий міхур лежить у жєнщини за місцем зрєсту соромних кістий, а перед матицею. Мочова цівка у жєнщини значно коротша як у мужчини і виносить 4 см.; вона ширша також як у мужчини і має своє устє в перед-



Образок 7.

Перекрій грудної залози
з переду в зад.

1. Papilla mammae.
2. Ductus lactiferi.

сінку похви, та відділена від ямистих тіл розкішницї (пор. образок 6).

До полових органів жєнщини належать також грудні залози. Вони приміщені під шкірою передної грудної стїни і складають ся з великого числа малих залоз такого виду, як грозно винограду, де витворює ся молоко, потрібне до кормлення новородка. Всї проводи молочні лучать ся в яких дваїцять головнїйших проводів і ті мають своє устє в бородавцї грудної залози (пор. образок 7). Грудні залози досягають у дївчини в часї полового дозрівання цїлковитого розвою; їх великїсть становить розвій елементів, що мають витворювати молоко, а також відповідне нагромадженє товщу помежи властивими елементами грудної залози, але вони розвинені дуже мало так, що звичайно лишень бородавка і троха нагромадженого товщу представляють залозу. Однак часом приходить, що і у мужчини розвиває ся неправильно одна або й обі грудні залози до значного обєму, до величини доброго кулака, або і ще бїльше.

II ФІЗІОЛЬОГІЯ ПОЛОВИХ ЧАСТИЙ ТІЛА.

а). У мужчини.

Коли полові части тіла дозрівають, показує ся ось яке природне (фізіольогічне) їх діланє. У мужчини витворює ся в яйцях мужеське сїмя, переходить через приїчє, дальше через провід сїмени і збирає ся на запас у сїменних міхурцях. Підчас полової злуки виходить сїмя з сїменних міхурців, переходить через проводи до виприскування сїмени і впливає до мочової цївки по обох боках сїменного горбочка, а з відси дальше через мочову цївку виходить із мужеського тіла через внїшний отвір мочової цївки. Підчас того, як сїмя переходить через мочову цївку, домішує ся до нього витвір крокової залози, який вливає ся до мочової цївки також по обох боках сїменного горбочка і витвір залоз “Купера”, який вливає ся до мочової цївки в початку ямистої части мочової цїв-

ки. Вітвір тих обох категорій залоз (крокової і Купера) прибільшує скількість слизоватої маси, що виходить на вні мужеського члена, однак її найважнішою частиною є сімя, яке вийшло з сіменних міхурців, бо лиш воно має в собі сіменні клітини. Сімя не впливає однастайно з мочної цівки на вні, але виприскуює то сильнійше, то слабше задля того, що початок ямистої части мочної цівки окружений умисними мязами, які в даній хвилі стягають ся і виприскують сімя з більшою силою. Сіменна клітина так маленька, що її можна добре оглянути лише при помочи побільшаючого скла (мікроскопу); вона складає ся з кліточки, або комірочки, наповненої плязмою (творчою субстанцією) і з нитковатої випустки, наче хвостика, який має здібність безнастанно рушати ся і тим способом посуває сіменну клітину наперед.

б). У жєнщини.

У полово дозрілої жєнщини витворює ся (дозріває) в яєчнику людське яєчко; воно кругле, завбільшки на п'яту часть міліметра, і видістає ся з яєчника до черевної ями тим способом, що очеревна болонa на яєчнику пукє на тїм місци, де лежить дозріле яєчко, а коли яєчко опустило яєчник, то кров наповляє те місце, де лежало яєчко і потому переміняє ся так як у синяку на шкірі, потім і пізнати свіжі місця, де були дозрілі яєчка. На місцях, де давнійше дозрівали яєчка, видно затягнені не величкі шрами. Яєчко дістає ся до устя трубки "Фальлопія", яке своїми торочками обхоплює його, вводить до проводу трубки і переводить до внутрішнього простору матиці (пор. образок 8).

Полове дозріванє жєнщини зазначає ся на вні появою відпливу крови із слизної болони в нутрі матиці, яке називаємо періодом або місячкою, бо воно повторяє ся правильно (періодично) що місяця. Жєнщина тратить при місячці 100 до 200 кубічних сантиметрів крови. Місячка появляє ся рівночасно з дозріванєм яєчка в яєчни-



Образок 3.

Шематичний перекрій жіночих полових частий тіла з ліва на право; показує положенє мандруючого яєчка і положенє заплідненого яєчка в матици.

1. Черевний отвір трубки
2. Права трубка.
3. Яєчник.
4. Простір трубки.
5. Яєчко.
6. Привязка яєчника.
7. Болонна довкола плоду.
8. Яєчко.
9. Ліва трубка.
10. Яма матиці.
11. Стіна матиці
12. Яма шийки.
13. Устє шийки.
14. Кондон
15. Отвір мужеської цівки мочової.
16. Велика губа.
17. Мала губа.
18. Похва.
19. Стіна похви.
20. Похвова часть матиці.
21. Шия.
22. Широка привязка матиці.
23. Кульочка Графа.
24. Вадруюче яєчко.

ку і походить з того, що слизна болона матиці приготується на прийняте дозріваючого яєчка, яке можливо буде запліднене мужеським сіменем і почне даліше розвивати ся в матиці, як плід. Коли однак яєчко не стане запліднене, тоді показує ся те приготованє природи зайве, кровоносні судини переповнені кровю тріскають а кров випливає через похвове устє матиці до похви, а далі через вхід до похви на вні жіночого тіла.

Коли дозріле людське яєчко має бути запліднене, то воно мусить злучити ся з сіменною клітиною мужеського сімени. Підчас полової злуки виприскує сімя із мужеського члена в похві жєнщини перед самою похвовою частию матиці до середини матиці і коли тутки стрінеть ся з яєчком, запліднює його. Запліднене відбуває ся тим способом, що сіменна клітина посувана на перед своїм хвостиком, пробиває ся крізь болоночку, що покриває яєчко, входить до його середини і плязма сіменної комірки лучить ся в одно з плязмою (творчою субстанцією) яєчка. Болоночка яєчка допускає до своєї середини лиш одну сіменну кліточку, почім зараз за нею замикає ся і не допускає більше жадної. Підчас полової злуки виприскує ся в сімени мужчини дуже велике число сіменних клітин, але до запліднення яєчка потрібна лиш одна, всі інші йдуть на марно. Запліднене може відбутися в матиці, або в трубці “Фальльопія”, або навіть у черевній ямі, бо сіменна комірка порушає ся на перед так довго, аж знайде яєчко. І справді знаємо в практичнім житю не лише правильні вагітності т. є. середматичні, але також неправильні т. є. позаматичні, що розвивають ся серед трубки “Фальльопія” і в черевній ямі. Неправильні вагітності погубні для дитини, бо в таких разях не може відбутися правильний порід через матицю і похву. Неправильні вагітності треба оперувати, щоби спасти жите матери; жите дїтий в таких разях треба пожертвувати, бо неправильні вагітності не можуть дійти до цілковитого розвою плоду.

Коли наступило запліднене яєчка, починає ся в тілі

жінщини стан вагітності, який триває дев'ять соняшних місяців або десять місячних місяців, значить 275 — 280 днів потрібних на правильний розвій плоду. На весь той час устає місячний відплив крові з матиці, бо засоби материнного тіла йдуть на живлене плоду. Підчас вагітності побільшають свій об'єм також грудні залози, де має витворюватися молоко, потрібне до кормлення новородка. Тоді витворює ся в грудних залозах клийкий плин, але материнське молоко появляється аж по породі дитини.

Вагітність триває дев'ять соняшних місяців, підчас яких розвиває ся із мікроскопово малої комірки яєчка дитина, спосібна до життя поза тілом матери. Тіло жінщини-матери проте значно стислійше получене з будучою дитиною ніж тіло чоловіка-батька, який лиш підчас запліднення яєчка бере уділ у покликанню до життя дитини. Акт плодженя запотребовує проте тіла жінщини без порівняння більше, довше й інтимнійше, ніж тіла чоловіка і тим поясняє ся значно більший інтерес чи привязанє матери до своєї дитини, ніж батька.

Підчас вагітності підпадає тіло жінщини значним змінам: місячка перестає показувати ся, об'єм грудних залоз, а особливо об'єм черевної ями, побільшає ся. Розвій заплідненого яєчка, яке тепер треба називати плодом, відбуває ся зразу (через три місяці) в малій лохані, а в дальших місцях побільшена матиця не може помістити ся в малій лохані, підносить ся до великої локані т. є до тої часті черевної ями, що лежить повисше соромних костей і доходить своїм горішнім краєм повисше пупця. Шкіра на передній стіні черевної ями розтягає ся значно, розступає ся на багатьох місцях, показуючи червоні середшкірні розриви, які по породі блідніють, але полишають на завсїди знаки в виді шрамів, білійших ніж решта шкіри (попородові шрами). Подібні знаки творять ся і на шкірі грудних залоз. Найбільшої зміни дізнає матиця; вона побільшає ся з об'єму доброї сливки до об'єму більш голови дорослого чоловіка. В ній розростають ся гладкі волокна мясні, які творять стіни матиці,

а потрібні також до того, щоби розвинений плід витискати підчас породу (злогів) із ями матиці. Ділане гладких м'ясних волокон не залежать від волі чоловіка, тож і при породі стягають ся вони тоді, коли плід дозрів і сама природа каже його видалити з матиці. Стягане м'ясних волокон матиці звисне під іменем породових болів, які наступають у відступах, довгих по кілька або кільканайцять мінут, а яким товаришить також напір м'язів черевної стіни. Плід лежить у матиці в так званім плодовім мішку, утворенім по часті зі слизної болони матиці, а по часті з самого плоду. Плодовий мішок обгортає плід довкола наче міхур, внішнім боком припирає до ями матиці, а внутрішній бік звернений до плоду обіймає троха ($\frac{1}{2}$ до 1 літра) плину, званого плодовою водою, в якій плід свобідно порушає ся, через що обезпечений від наглих змін тиснення або й ударів, що мимо волі або умисно можуть досягти черевну стіну матери. Одна часть плодового мішка звана "місцем", що відзначає ся великим засобом кровоносних судин і має форму пляцка, є завбільшки доброго кулака і звідси тягне ся до пупця плоду пупцевий мотуз, зложений з трох кровоносних судин (двох матерії і одної жили). Пупцевою жилою допливає до тіла плоду відживляюча кров, а обома пупцевими матеріями вертає з'ужита кров із тіла плоду до "місця". Кровоносні судини матери і плоду не стоять у простій звязи зі собою, але кров мами переходить до кровоносних судин плоду тим способом, що просякає крізь дуже тоненькі стіни. Пупцеві кровоносні судини відв'язують ся по породі плоду і перерізують ся (звідси конвенціональний зворот у повідомленнях про порід дитини, що "мати щасливо розв'язана"). В тій хвилі дитина перестає діставати кров від матери, відчуває потребу доброї (черевної) крові і се перший стимул, що дитина починає дихати, втягати воздух у свої легкі, щоби киснем воздуха відновляти кров свого тіла. Ся хвиля зазначає ся першим плачем (криком) дитини. Вона кричить не з болю, але з голоду воздуха, що входить тепер у легкі і розширяє їх.

Крик дитини по породі є конечністю, добрим знаком. Коли у вагітної жінки показуться перші породові болі, значить перше стягане м'ясних волокон матиці, зачинаються “злоги”, себто плід породу. Породові болі мають за задачу розширити канал у шийці матиці і се відбуває ся так, що плодова вода тисне на плодовий мішок і сей витискає ся в шийку матиці і розширяє її. За час вагітності всі частини полових органів жінки значно змякли (виделікатніли) і тому під впливом напіраючого плодового мішка розширяє ся похвова частина матиці, хоч вона в звичайнім стані майже хрящовато тверда. Коли шийка матиці доволі розширилася, тріскає плодовий міхур, плодова вода відпливає на вні і тепер плід робить собі вже дорогу головою. Переходячи через похвовий вхід, головка звичайно розриває те місце, де зросли ся великі губи і дуже часто надриває також частину межикроча, яке після породу знов зростає ся а нерідко треба його операційно зшивати. Після породу дитини і перерізання пупковини (пупцевих артерій і жил) полишає ся ще якийсь час (чверть, пів або й цілу годину) місце в матиці, яка опісля витискає його скорченєм своїх стін. Яма матиці є тепер великою раною, закровавленою і позбавленою слизної болони. В протязі яких десятих днів стягає ся матиця, її об'єм меншає, слизна болонка відроджує ся і жінка опускає ліжку. До звичайної величини вертає матиця аж по яких шістьох тижнях. Кормлене дитини молоком власної матери є для дитини найліпше і триває яких десять місяців. Потім вже може дитина обійти ся без матернього молока та кормить ся молоком корови і іншими стравами. Нерідко однак кормлять матери своїх дітей і довше, раз тому, що “їм жаль” відлучати дитину, а потому ще й тому, бо підчас того як дитина ссе рідну матір, то у матери не показує ся місячка і жінки думають, що тепер не можуть стати вагітні. Однак се не все справджує ся. Довге кормлене для дитини очевидно добре, але для матери часто получене з занепадом відживлення тіла і здоров'я взагалі.

III. ПОЛОВА ЗРІЛІСТЬ.

Полове дозріванє наступає в нашім підсоню у дівчат звичайно 12 до 14, а у хлопців звичайно в 14—16 році життя. Виїмки бувають одначе не рідкі так, що полове дозріванє випереджає поданий термін або опізняє ся. Великого значіння на полове зрілість є якісь будови тіла, перебути хороби, якісь відживленя і таке инше. Задля полової зрілості наступає переміна в тілі хлопця чи дівчини і впадає в очи внішно кождому, бо з дитини-хлопця і з дитини-дівчини стає хлопець-мужчина і дівчина-жінщина. У хлопця переміняє ся голос із сопранового на теноровий (мутація голосу), засіває ся заріст на лиці, а в обох полів також заріст на половых частях тіла, головню на горбку Венери, а також під пахами. Вираз лиця до тепер дитинячий, значить полове індиферентний, набирає характеру свого пола, а як хлопець так дівчина, відчувають взаїмно противний пол, скажім пол самця і самиці. У дівчини показує ся що місяця уплив крови із слизної болони матиці; дівчина підчас менструації стає більше вразлива в психічній сфері, її тіло стає більше приступне на шкідливі внішні впливи, тому вона не повинна тоді купати ся, наражати ся на простуду, перемочене ніг, не повинна гімнастикувати ся, танцювати і т. п. У дівчини розвивають ся сильнійше грудні залози і вистають понад стїну грудної клітки. Клубові кости розростають ся у дівчат ширше як у хлопців і взагалї лохань, то є простір, обнятий бедровими кістями, у жінчини обширнійший, ніж у мужчини, бо у жінчини сей простір призначений на те, щоб там могла вигідно помістити ся матиця зі своїм змістом підчас вагітності. Тому дівчину пізнати по розрослих бедрових костях навіть тоді, коли вона перебере ся за хлопця. Є ще одна ріжниця в будові лохани у мужчини і жінчини, якої зовнішно не видно. Є се кут, під яким стикають ся зі собою ті рамена соромної кости, що йдуть від зросту на долину. Сей кут у мужчини острійший, а у жінчини тупійший, значить ширший, бо вихід

із логані на долину в напрямі до входу похви потрібний як найширший для переходу для дитини при породі. З половою зрілостю повстають у мужчини напруження мужеського члена. Під впливом полового подразнення напливає багато крові до ям усіх трох ямистих тіл мужеського члена задержує ся в ямах і доводить до напруження мужеського члена, який стає з м'ясисто м'якого майже хрящкватим твердим. Прилади до напруження члена є вже в дитини, але що дитина-хлопець не має полових почувань, то й напружене мужеського члена не показуєть ся у нього. Се наступає аж наспілою половою зрілостю. В стані напруження мужеського члена шкіра стає для нього мала, тому відтягає ся залупа з головки мужеського члена, а відслонена головка стискає ся ніжно своєю шкірою з попережними фалдами на слизній болоні похви і як при введеню члена до похви, так і при дальших рухах, дознає що раз то більшого подразнення, яке досягає свого верховного пункту в хвили виприскування сімени із мужеського члена до похви. В сій хвили находить ся внішній отвір мочної цівки перед самим похвовим отвором шийки матиці і сіменні клітини можуть входити до ями матиці, де можливо стрітять дозріле яєчко із женського яєчника. Полову розкіш відчуває мужчина в головці мужеського члена. Після того, як мужеське сімя виприснуло із мочної цівки, починає відпливати назбирана кров в ямах ямистих тіл мужеського члена і мужеський член прибирає назад свою м'ясисту м'яккість. Цілий організм мужчини переходить зі стану подразнення в стан загального задоволення, заспокоєня і оспалости, часто находить на мужчину серед того сон. В стані утоми тіла після полові сполуки наступають також в інших нервах переміни; і так: запах жіночого тіла, який перед хвилиною мужчину подразняв і був йому дуже пожаданий, дотик шкіри женщины, зладжене, примилуване — все те стає йому тепер або байдужне, або противне. Ту чисто зми слову жажду одного пола получить ся полово з другим полом називаємо “лібідо сексуаліс”. Здаєть ся, се зми-

слове пожадане у мужчини більше, ніж у жінки, як загалом у цілій половій злуці мужчина грає більше діяльну роль ніж жінка, яка заховує більше пасивну роль.

У жінки, коли вона вперше половою лучить ся з мужчиною, роздираєть ся серед більшого або меншого болю ніжна дівоча болонка у входу до похви підчас введення мужеського члена. Полове подразнене жінки побільшає ся дотиком мужеського члена до фаллів слизної болони в похві, а головню з розкішницею і обома сплетами жил по обох боках передсінка похви. Обі похвові залози витворюють лойовату масу, яка має улекшати терте мужеського члена при вході до похви. Полової розкоші дізнає жінка подібно як мужчина відчуваючи її в розкішниці і в сплесах жил без впливу або виприскування якого небудь плинну аналогічного з мужським сіменем. Однак того почуття не все дізнають оба поли рівночасно підчас половой злуки, бо дразливість обох одиниць, які лучать ся половою, може бути неоднакова. А що мужчина виступає при половій злуці як сторона діяльна, то він може задоволити свої полові почування із жінкою, у якої “оргасмус” приходить скорше, бо жінка в дальшій тягу злуки остає пасивна. Коли жінка менше вразлива, як мужчина і у нього половою розкіш настає скорше, як у жінки, то жінка в такій разі взагалі не доходить до почуття половой розкоші, бо по впливі сімени мужчина перестає брати уділ у половій злуці.

Що до частоти, з якою може наступати половою злука мужчини і жінки без шкоди для тіла обох, панує дуже велика ріжнородність. Можність половой злуки у молодих і здорових осіб загально більша, у схорілих, зле відживлених, старих, менша. Однак загальних правил тут годі встановити. Найбільше знана в тім згляді вказівка Лютра, який відзначав ся розумом і на тім поли; він радить злуку два рази на тиждень, значить, у році сто чотири, бо се “не шкодить ні тобі, ні мені”.

IV. НЕПРИРОДНЕ ЗАСПОКОЮВАНЄ ПОЛОВОГО ГОНУ.

З хвилею полового дозрівання мало коли заспокоюють хлопці свій половий гін природним способом через полове злуку з особою другого пола. Звичайно застає полова зрілість хлопця неприготованого, значить несвідомого, що з ним діє ся. А хоч хлопець і поучений про значіне напруження мужеського члена, то все таки стоїть на перешкодї до фізіольогічної злуки соромливість і цілий ряд товариських (соціяльних) перешкод. Полове життя розвиває ся правильно єдино в правильнім подружжю, а сього не заключає в нас в 15 році життя. Полове жите молодого хлопця звернене про те на дорогу проституції, а коли на сю дорогу його не впускають моральні згляди або пострах перед заразливими хворобами, то хлопець мусить вибрати тілесну чистоту (кастітас), значить цілковите здержане від полових зносин з особою другого пола — і се найліпше; або він попадає в порок онанії (мастурбації) самонасильства, (самоосквереня). Додержуване тілесної чистоти для здоровля зовсім нешкідливе; тілесна чистота ще ніколи нікому не пошкодила. Але вона вимагає моральної сили, на яку не кожний годен здобути ся. Колиж хлопець захоче тілесну чистоту, то має знати, що витворене сімя в яйцях і переховане до часу в сіменних міхурцях відпливає від часу до часу власновільно в сні, найчастійше під впливом любовних (еротичних) снів, де здаєть ся хлопцеві, що він зближає ся або й злучує ся полого з особою другого пола. Сей уплив сімени називаємо полюцією і він получений звичайно в безпосереднім наслідстві з великою утомою цілого тіла, значно більшою чим се спричиняє уплив сімени підчас природної злуки з женщиною. Ся утома триває кілька годин і переходить без якихнебудь шкідливих наслідків. Тому не треба уважати полюцій за щось хворобливе, коли вони виступають самі з себе в міру того, як назбирає ся подостатком сімени в сіменних міхурцях. Сї полюції треба остро

відріжнити від випрiskyвання під впливом умисного дразнення полових частин, головню мужеського члена через потиране рукою і затиране залупи, потиране одінем, через виконувале соромливих рухів тілом, при чім притискає ся полові органи до других предметів, як постіль, земля і т. и., в тій ціли, щоби довести до полові розкоші через випрiskyване сімени. Подібним способом можуть дівчата подразняти свої полові части тіла потиранем рукою, або одінем, вводити палець або ріжні предмети до похви, можуть утнітати грудні залози, стискати уда, виконувати соромні рухи своїм тілом проти твердих предметів аж до викликаня полові розкоші. Навіть самі гадки про полову злуку, повторювані з упертостію, можуть у вразливійших дівчат доводити до неприродної полові розкоші. Але дівчата при тім не нищать свого тіла так як хлопці, бо у дівчат нема чогось такого як уплив сімени у хлопців; а коли і наступить вплив слизного плин у, то є се досить байдужне виділене з слизних залоз у похві. Інший так само неприродний і ві всіх наслідках шкідливий спосіб заспокоювання пологового гону є передастія (у мужчин) і грецька любов (у дівчат). Є се полові зносини з другою особою того самого пола. У мужчин відбуває ся се звичайно тим способом, що мужеський член одного мужчини вводиться в відходову кишку другого мужчини і доводить ся до випрiskyвання сімени. У женщин доводять пристрасні обійми, взаїмне цілюване, соромне лягане на себе, стискане грудних залоз і потиране полових частин до неприродної полові розкоші. Як педерастія так і грецька любов не приходять у здорових людей що мають природні полові почування. Хто почуває полові зворушення під впливом другої особи того самого пола, такого чоловіка треба уважати за аномального (неправильного); його успособлене є хоробливе і називає ся гомосексуальським (рівнополовим). Гомосексуальність є неприродним почуванем і великим нещастем для чоловіка, вивінованого таким збоченим наклонем. Гомосексуальні зносини заборонені в Австрії і

Нівеччині карним законом; на людей, що виконують такі зносини, назначені тяжкі кари, що очевидно ще побільшає нещастє чоловіка, настроєного гомосексуально, бо він мусить укривати ся зі своєю хоробливою природою з товариських причин і з уваги на карний закон. Такі люди справді гідні пожалування. По біблійному оповіданю була педерастія причиною кари, якій підпали Содома і Гомора. Нині називаємо содомією неприродне заспокоюванє полового гону через полові зносини зі звірятами другого пола (скотоложство). Карні закони забороняють і карають тяжко такі полові зносини.

V. НАСЛІДКИ ОНАНІЇ.

Як у хлопців, так і в дівчат онанія, то є насильничий спосіб доводити полові части тіла до чинностей подібних до природних, вельми шкідлива і для тіла і для духової сили. Онанія (самонасильство) грає меншу роль у дівчат задля пасивности їх пола в половых зносінах взагалі, коли противно в розвою тілеснім і умисловім хлопців онанія грає не раз дуже, а дуже сумну роль.

Непоучена молодіж є зразу, коли віддає ся онанії, в цілковитій несвідомості того, що вона робить; вона навіть не догадує ся, що самонасильство підкопує сили власного організму в дуже високій мірі; хвилює дізнає молодіж тілесної розкоші, уживає і надуживає її потайно так довго, аж сама або її оточенє спостереже, що шкідливий вплив самонасильства відбив ся очевидно на тілі і на духовій вдачі молодого організму.

Під впливом самонасильства підупадає тіло і хлопець (чи дівчина) попередно жвавий, еластичний, червоний на лиці, стає блідий, з синіми смугами попід очима, все наче невиспаний, утомлений, слабкий. В духовій сфері показує ся що хлопець (дівчина) попередно цікавий, який легко піймав всяку науку, стає тупий, байдужний, непонятливий, невитревалий при духовій праці навіть лекшого рода. Загальний настрій переміняє ся з весело-

го в мрачний (песимістичний) так, що випаде недавно веселого хлопця (дівчину) назвати молодим старцем, бо він молодий віком, але тяжкий, прибитий і сумний, неначе у схорованого, дряхлого старця. Очевидно, що такий стан, така переміна в природі хлопця (дівчини) не може уйти уваги і самого хлопця (дівчини) і його учителів, чи родичів тай вихователів або сповідників. Тепле, сердечне поученє зі сторони старших певно все влучить у молоде і чутливе серце хлопця (дівчини) і він повинен зібрати весь запас сили волі, щоби не сповнювати насильства на власнім тілі. Бо шкода заподіяна молодому тілу не обмежує на саму одиницю. Треба тямити, що з одиниць складає ся родина, з родини суспільність, цілий нарід. Всяке ушкоджене одиниці, повторюване і помножуване, мусить відбити ся некорисно на родині онаніста, в першій мірі на його дітях; винищений організм онаніста не годен витворити сильного тілом і духом потомства, бо звісно, що сова не зродить сокола, а хирляк годен сплодити лиш хирляка.

При ліченю самонасильства грає головну роль добра воля хорого, бож годі не назвати хорим такого, що винищив своє тіло і свої духові спосібности самонасильством. Під впливом онанії терпить дуже значно сила волі, а до того полова дразливість значно збільшає ся. Ерекції мужеського члена у хлопців викликає ся дуже легко чи то близькістю осіб другого пола, чи то через незначне потиранє одінем або пальцями, а навіть через стидливі думки або погляди на соромні образи і предмети. Тим способом попадає хлопець (дівчина) у блудне колесо: онанізм зменшує силу волі, а знов брак сили волі здержує хлопця (дівчину) від опам'ятання тай здержливості, а продовжувана онанія зменшує що раз більше духову енергію (волю) і тілесну відпорність. Доходить до того, що підчас спання під впливом еротичних (любовних) снів або і без них легко і часто наступають полюції, то є вплив сімени неначе підчас природних зносин полових або під впливом самонасильства, а дальше дохо-

дить до впливу сімени із мочевої цівки і без звичайного почування половой розкоші. Сей стан називаємо витіканем сімени (сперматоррге). Такий стан дуже прикрий, бо тепер навіть найкріпше зібрана сила волі показує ся безсильною супротив страти сімени проти волі, в білий день і при цілковитій свідомости. В анальогічний спосіб доводять дівчата самонасильством свої полові части тіла до впливу слизного плину з похви в хвили найбільшого полового подразнення, а сей вплив потягає за собою загальну втому тіла, обезсиленем його, умову утому і тупість. В таких хвилях находить на онаніста все велике моральне пригноблене. Він (вона) відчуває тілесно трохи не біль у цілім організмі, а морально відчуває велике понижене і обриджене і все будять ся острі закиди сумління, що таке поступоване (самонасильство) є поведенем морально обридливим і плюгавим. Дуже багато онаністів приходить у такім моральнім сокрушеню до похвальної постанови, закинути самонасильство — себ то доходять до тези “пізнай себе” — і додержують сеї постанови опісля через память на той стан обиджаючий все благородне в їх душі, який наступає по упливі сімени, полученім із вичерпанем тілесних і умових сил. Навіть дуже значно підкопана сила волі зриває ся в тих хвилях до твердих рішень — і щасливий той, хто ведений сумлінням, рішає ся тепер закинути онанію і додержує свою постанову, зобовязуючи себе неначе словом чести перед самим собою.

Наслідком довготреваючої онанії повстає загальне ослаблене нервів у високім степені (неврастенія), при чім вразливість на внішні впливи, як крик, спів, тріскане дверми або навіть троха голоснійше говорене, нагле отворене дверей, стає так велике, що всі ті дрібниці видають ся хорому невиносимі. Онаніст неспосібний до довшої або тяжкої праці, невитревалий на тілесні труди, його воля цілковито підорвана і тому-то не можна в ніякім ділі спустити ся на нього. Він стає задля того тягарем для свого окруження, бо не лиш для нього не ужиточний, але

навпаки вимагає від оточення всяких послуг і старань. Довго триваюча онанія може довести чоловіка до полові імпотенції, то значить до цілковитої неспосібності виконувати правильні полові зносини з особою другого пола, бо у нього не приходить до ерекцій мужеського члена під впливом полового природного подразнення, а се знов впливає дуже некорисно на душевне успособлене онаністів, викликає в них такий прикрий (песимістичний) настрій духа, що доводить їх не раз до самовбійства. У дівчини доводить довготривала онанія попри загальне підкопане сил тіла і духа, що до місцевих недуг у полових частях, а саме до катарального запалення слизної болони похви і матиці. Також м'ясна частина, (стіна) матиці бере з часом уділ у хронічному (довготривалім) запаленні слизної болони, грубіє, пухне і спричинює глухий біль серед лохані. Сей глухий біль спричинений тим, що спухла матиця побільшає ся в своїм об'ємі, прибирає на вазі і тягне сильніше свої прив'язки (лігаментум латум, лігаментум терес), які удержують її в правильному положенні і сходять трохи нижче в лохань, як повинна лежати. При тім гнеться трохи більше на мочовий міхур, згинає ся сама неправильно в котрийнебудь бік, тисне на яєчник, тягне за собою трубку "Фальлопія". Задля того підпадає з часом яєчник запаленню, пухне, побільшає ся і є головним жерелом упертих, довготривалих і прикрих, хоч не точно означених, болів в лохані. Сі болі підкопують своєю дорогою в високій мірі здоров'я жіночого організму. Катаральне запалення слизної болони матиці, розвинене в значній мірі, може бути причиною неплідності жінчини.

VI. ЛІЧЕННЯ ОНАНІЇ.

Хорих на онанію треба дуже остро наглядати в день і в ночі, щоб їх тим способом здержувати від самонасильства. Не треба їх полишати на самоті, чи то на самотних проходах, чи то в помешканні. Треба наглядати,

щоб вони ніколи не задержували ся виходках, довше, ніж се конечно потрібне. Треба їх перестерігати перед злим товариством інших хлопців чи дівчат, що самі віддають ся онанії, а морально зіпсовані, ведуть безсоромні, цинічні розмови, які обиджають кожного, хто виріс серед здорового і морального оточення. Коли хто попав у таке зіпсоване товариство, то треба його відтягати звідтам усіма можливими способами. При тім усе має головну вагу моральний вплив добре зичливих осіб, як родичів, старших товаришів, лікарів, учителів. Приязні слова тих осіб мають впоїти в хорого те переконання, що його поступоване шкідливе для тіла, а з етичного боку в високім степені неморальне. Особливо можуть впливати на онаністів лікарі і щирі сповідники, бо ці особи законно обов'язані до виховання тайни перед третіми особами про все те, чого довідають ся титулом свого звання. Онаніст може проте звертати ся до них із цілковитою певністю, що його зізнання, які творять тайну його душі, остануть тайною для всіх. Звернути ся до лікаря, згідно до сповідника, випадє онаністови не раз уже й тому, що він непевний, чи справді піддав ся онанії. Не один онаніст думає, що він не поповняє онанії, коли з початком виприскання сімени сильно тисне рукою мочову цівку так, що сімя не може виприскувати на вні, але остає в цівці, згідно впливає до мочового міхура. Інший онаніст знов думає, що він вибрав із двох злих менше зло, бо рішив ся онанізувати, замість вдавати ся з проституткою, відки може набрати ся заразливої хвороби.

Треба, щоби хорі, які підлягають онанії, не читали таких книжок, що подразняють їх уяву в половім напрямі, треба уникати розмов про полові справи, ведених в очевидно не чистих цілях, як се власне роблять морально звихнені товариші. Не треба оглядати образів, що представляють голе тіло другого пола або самі полові органи в очевидній цілі впливати побуджаючо на полові думки глядача. Треба старати ся зайняти онаніста духовою пра-

цею, гарною лектурою, а ще більше заняти його всякими розривками і забавами, полученими з рухом на свіжій воздусі і довгими проходами в товаристві других; механічною роботою (як столярством, огородництвом і т. д.), щоби опісля утомлене тіло могло з апетитом приймати страти і добре (без еротичних снів) спати. Перед сном треба умисно менше їсти, ніж у день, тай то треба вечеряти зо три години перед сном. Коли вночі пробудить ся онаніст задля того, що в міхурі назбирало ся мочі, треба, щоб зараз віддав моч (хоч би і кілька разів підчас ночі), бо наповнений міхур мочою спричинює ерекцію мужеського члена, а далше і виприскунне сімени підчас сну. Ерекцію мужеського члена треба усунути тим способом, що відкриває ся ціле тіло на охолоду, або навіть через поливане напруженого члена холодною водою. Рано не треба вилежувати ся довго в ліжку, особливо в м'яких, повних подушок і перин, але треба, щоби онаніст зараз уставав, скоро пробудить ся, бо інакше легко підлягає покусі і онанізує ся. Ліжко нехай буде тверде, т. зн. під головою тверда волосяна або й солом'яна подушка, сінник наповнений солом'ю, за накривало нехай служить твердий вовняний коц, а в літє вистарчить простирало. Спати треба все на боці, а ніколи на хребті (назнак), руки треба тримати на покривалі, а коли випаде руки ховати задля зимна під покривало то треба тримати їх при грудях, а ніколи при полових частях тіла. В однім ліжку нехай ніколи не спить двоє або й більше осіб, але все нехай спить онаніст сам один. Алькоголю нехай онаніст уникає цілковито і у всякій формі, бо алькоголь подразнює полові органи і жене хорого до самонасильства. Умивати ся треба онаністови все зимною водою і то не лише лице, але натирати руки і груди і хребет зимною водою. Треба вистерігати ся читати такі книжки про полові хвороби і про онанію, що писані несумлінними авторами-дурисвітами (шарлямантами) в очевидній цілі настрашити несвідомих і недосвідчених. В таких книжках представляють ся полові

хороби і наслідки онанії в так страшних красках, що онаніст, чи там хорий на полову хворобу, тратить голову, попадає в розпуку. Але автор-дурисвіт показує в сій же хвили на себе, як на одиноку дошку спасеня. Обіцяє лічити (очевидно за платню) листовно, обіцяє посилати ліки потайміру, дискретно, — і допинає свого, то є використує незнанє і недосвідченє молодого онаніста і обдирає його з гроший, а рівночасно наносить йому без порівняня більшу шкоду на дусі, підкопуючи слабї моральні сили онаніста або й вичерпуючи їх цілковито. Такі книжки сїють багато зла, тому треба знати їх й уникати.

Очевидно, що коли онаніст на підставі сих вказівок не годен собі дати ради, треба, щоби звернути ся за порадою до лікаря або щирого, розумного сповідника, де все знайде тепле, поучаюче слово і приятну моральну потїху, тай покріпленє.

І так при згідливім, щирім поученю зі сторони старших, а добрій вірі хорих у любов і приятнь їх опікунів тай при добрій волї можна відзискати давне, молодече здоровлє, бо молодість доказує чудес. Треба лише зрозуміти шкідливість самонасильства, треба кріпко постановити собі покинути самонасильство, а осягне ся по довшім часі бажану ціль, то є що тіло кріпшає, страта сїмени меншає, сила волї і всі духові здібности вертають до природної сили і з молодого старця стає знов повний сили молодець як на тілі, так і на дусі.

VII. ПРИРОДНІ ПОЛОВІ ЗНОСИНИ.

Половий гін у осіб обох полів показує ся тоді, коли полові части тіла дозріють і здібні до виконування природної (фізіологічної) задачі. У плоду повстають полові части тіла у обох полів у околиці крижий там, де лежать пізнійше нирки, по обох боках хребетного стовпа. З разу не видно в них ріжниць мужеського і женського пола, аж при дальшім розвою плоду виступає ріжниця

обох полів. Однак часом родять ся неправильно розкинені плоди з такими половими частями тіла, що про них годі сказати чи вони мужеські чи женські, бо стрічають ся деякі прикмети одного пола, а деякі прикмети другого пола. Такі діти називаємо гермафродитами (мішаного пола) і коли вони підростуть то мають нераз дуже утруднене товариське (соціяльне) положенє, бо самі не знають, до якого пола їм зачисляти ся, або знов тому, що відчують полово не так, як випадало би їх офіціяльно в метриці записаному полу.

Розвій полових частий тіла, а головнo яєць (тестікулі) у мужчин і яєчників (оварія) у женщин, має великий вплив на розвій цілого тіла, бо коли в дитинстві позбавимо тіло хлопця яєць, а тіло дівчини яєчників через умисну операцію (кастарацію, валашанє), то такі кастровані організми розвивають ся зовсім инакше, ніж звичайно і впадають в очі своїм зверхнім і тілесним виглядом і душевним, внутрішнім успособленєм. У кастрованих мужчин, званих евнухами (різанцями), остає дитинячий тонкий голос, заріст на лиці у них або дуже скупий або й зовсім не показує ся. У кастрованих женщин не розвивають ся бедра так сильно, як у правильної женщины. У обох кастрованих полів є багато примх, надмірної нервової вразливості, хороблива честилюбивість і т. д., одним словом розвій їх організмів звихнений, неприродний. Є се виключний вплив усунення полових органів, яєць і яєчників, бо такого лихого впливу на організмі не видимо, коли кастрацію виконає ся на організмі, який вже розвинув ся і полово дозрів. Розвинений, але кастрований мужчина, годен полово получить ся з женщиною, однакo виприскуване “сімя” не має в собі насінних клітин, а складає ся головнo з виділення крокової залози. Кастрована женщина може полово злучити ся, але не може стати вагітною, бо у неї не витворюють ся яєчка; у неї може навіть показувати ся і місячка, наче би правильно дозрівали яєчка. В нашій суспільности не трапляють ся різанці, хиба що задля хороби або скалічення треба усунути

яйця або яєчники з організму і то звичайно у дорослого осібника. Вітчиною різанців (евнухів) є орієнт (Туреччина і т. д.), де мужеські різанці призначені до стереження численних жінок (гаремів) багатих господарів.

Коли здорові полові части тіла розвинули ся і дозріли правильно, тоді повстає в них гін до природного діланя, зразу неозначено в виді бажання і неточної туги за особами другого пола, однако без виразного стремління до половой злуки. Коли для полово недозрілого організму був другий пол байдужний і його не потягав до себе, то тепер добачує полово дозрілий осібник в осібнику другого пола цілий ряд об'явів, які його подразняють і потягають до себе. Вираз лиця, погляд очий, спосіб ходу, особливі властивости убраня, строю і т. д., все те будить у нїм полову тугу аж до того степеня, що у мужчини виступає мимовільне випрiskyване сімени (польюціо) або доводить його до насильного спусканя сімени (онанії) або до заспокоєня полового гону через полову злуку з особою другого пола. Чисте змислове жаданє злучити ся з собою другого пола називаємо “лібідо сексуаліс” (полова пожадливість) і вона кінчить ся з хвилею заспокоєня полового гону, то є з хвилею видаленя сімени з сіменних міхурців, де воно зібрало ся було на запас. Подібна пожадливість полова у жєнщини стремить до того, що би через полову злуку з мужчиною заспокоїти половий гін. Полова пожадливість дуже ріжна у ріжних одиниць: коли воґа надмірно розвинена у мужчини, називаємо її сатиріязіс (від мітольоґічних сатирів, про яких йде традиція, що вони були вельми кохливі), а коли надмірна полова пожадливість проявляєть ся у жєнщини, називаємо її нимфоманія (від подібної прикмети у мітольоґічних німф). Надмірна полова пожадливість у мужчини получена з більшою утомою цілого тіла, ніж у жєнщини, бо при випрiskyваню сімени, мужчина тратить багато білковатої субстанції, чого у жєнщини нема. Однак не треба думати, що надмірна полова жадоба у жєнщини обходить ся без коштів для цілого тіла; вона дізнає по-

дразнення цілого нервового систему і тим вичерпує сили організму. Як довго мужчина в силі виконувати полову злуку, так довго він полово здібний і та полова здібність триває звичайно до 60 року життя, а часто й довше. Попри здібність полової злуки у мужчин треба розрізнити здібність плодження, яка залежить виключно від того, чи у виприсківанні “сїмени” підчас полової злуки є сїменні клітини (сперматозоон). Може проте трафити ся, що яйця мужчини, зіпсовані запаленем (епідидимітис), не витворюють сїменних клітин і навіть молодий мужчина тратить здібність плодження (потенція генеранді), хоча у нього заховує ся ще довгий час здібність до полової злуки. Полова здібність у женщин триває так довго, як женщина може стати вагітною, а то буває звичайно від 13—14 до 40—50 року життя, то є до хвилі, коли перестають дозрівати яєчка в яєчниках женщины і перестає показувати ся місячний вплив крові з ями матиці. Сей час у женщины називає ся переходом (клімактерієм). Місячка не устає нагло, але поволи зменшає ся скількість крові; місячка показує ся що два далі що три місяці, а далі зовсім устає. Нераз триває рік або й два роки доки цілковито перестануть періоди. Чим нагліїші і чим в раншій віці наступить переходовий час, тим прикрійші обяви товаришать йому, тим тяжші заворуєня в сфері нервів таї болі в полових частях тіла виступають у женщины. Коли устане місячка то женщина може і дальше полово полувати ся з мущиною, однак не може стати вагітною. Також і полова пожадливість може тривати й далі як поперед.

Попри полову пожадливість треба осібно піднести висшу любов, яка справляє, що двоє людей противних полів тужать за собою і бажають бути близько себе, жити з собою і завести родину. Висша любов не вільна від полової жадоби, але коли полова жадоба уступає з хвилею успокоєня полового гону, то висша любов остає дальше і править житєм тих осіб. Висша любов має свій осідок у душі (в звоях великого мозку) і вона опановує істоту женщины в висшій степені, як мужчину. Женщина бере

уділ у половім життю значно довше і глибше, як мужчина, бо коли заплоднене яєчка сіменем вимагає від мужчини лиш одної злуки з сіменем, то вагітність після сього запліднення триває в тілі жінки дев'ять місяців, а потім кормлене новородка вимагає знов 6 до 10 місяців чинності женського організму. Тому видно, що любов (полове жите) грає значно більшу роль в житті жінки, як у житті чоловіка, і що завід, нещасте і клопоти полового життя дотикають жінку без порівняння більше, ніж чоловіка.

Полова жадоба і висша любов не зв'язані з собою так, щоби кожен з тих почувань, не могло існувати окремо. І се приходить досить часто, що полова жадоба може повстати у чоловіка, зв'язаною висшою любов'ю в щасливій подружжю, на вид нової женської появи, яка притягає його якоюсь властивою прикметою, чи будовою тіла, чи способом ходу, чи зором так, що він зараз забажає получити ся з нею полово, хоча не раз у своїй мислі погорджує нею і після половної злуки найрадше бажав би про неї забути. При тім ні крихту не обнизила ся його висша любов до своєї жінки, до якої він задля навикнення, відчуває полове жадобу у меншій степені. Подібної наглої половної жадоби не відчують жінки, зв'язані висшою любов'ю з чоловіком, бо у них більше розвинений моноандричний нахил (нахил до багатьох жінок), а також тому, що етичні згляди мають більшу вагу у жінки зв'язаної висшою любов'ю, ніж у чоловіка.

Коли окремішки різного пола дозрілі, зійдуть ся разом, та обоє собою зацікавлять ся, то починає ся між ними залицяне (флірт). Чоловік виступає як заціпна сторона і то звичайно так, щоби в разі відкинення залицяння він міг усунути ся без образи свого самолюбного чуття. Коли ж жінка приймає його залицяне, то ознаки взаємної симпатії стають щораз виразніші і йдуть звичайно від поглядів через слова до дотику. Час залицяння може бути дуже різно довгий, поки доходить до половної злуки.

Законне подружжє серед наших соціяльних відносин неможливе в тім часї, коли дозрівають полові части тіла у мужчини і женщины, бо в тім віці молоді люди не мають засобів до заснованя родини і до плеканя дітий. Тому заспокоєнє полового гону у дівчат аж до виходу замож, то є до 18—20 року житя виключене, в мужчин же виключене воно до часу женитьби, то бодай до 24—25 року житя. Тай то треба знати, що полові органи не надають ся до полових функцій, як довго не розвинули ся цілковито, особливо у женщин, доки не розвинула ся добре лохань, а то наступає аж між 18 або 21 роком житя. Однакож нераз мужчини заспокоюють половий гін дорогою проституції. Проститутками називаємо ті одиниці жіночого пола, що задля тяжких житєвих відносин, задля нужди, нерівної борби про щоденний хлїб, при браку відповідного вихованя, освіти або занятя, віддають ся мужчинам за гроші. Проститутки творять клясу людського товариства дуже бідну з морального боку, як рівнож нужденну матеріяльно; між ними є доволі таких, що свідомі своєї тяжкої долї рвуть ся до світа, та рідко з добрим успіхом. Про се належить памятати і треба радше схилати ся до співчутя, ніж до того, щоби кидати на них каменем погорди.

З уваги на те, що проститутки віддають ся кождому мужчині за гроші, не вважаючи на його стан здоровля, то вони підпадають дуже часто зараженю половими (венеричними) недугами, коли мужчина, сам діткнений половою хворобою, в стані спосібнім заразити проститутку сходить ся полово з нею. Під зглядом полових недуг люди, як мужчини, так і проститутки, дуже несовісні, не-уважні. Хорий мужчина свідомий того, що він може заразити проститутку, а від неї може заразитись цілий ряд инших мужчин, звичайно так безоглядний на своїх ближних та несовісний, що памятає лиш на свій егоїзм. Заражені проститутки відплачують ся мужчинам тою самою дорогою. Звідси походить, що вигубленє полових (ве-

неричних) недуг стрічає непобориму перешкоду в самій людській несовісності.

Щоби молодіж зовсім певно охоронити від полових (венеричних) недуг, найліпше цілковито здержати ся від полових зносин із проститутками, то зн. заховати цілковито чистість тіла, а за те звернути енергію молодого, полово - дозріваючого тіла на інше поле, а то, заставити тіло до сильнішої і духоволі і фізичної праці, при якій зужие ся найбільша частина тої енергії, яка пішла би на витворення полових почувань. Таким заняттям для молодого тіла є інтензивна духовна праця і забави на вільнім воздуху, получені з працею м'язів: кичка, пилка, всякі вправи гімнастичні прогульки за місто, крокет, лявнтенніс, ніжна пилка і т. и. Се все дуже розширені забави в західній Європі, головню в Англії і відповідають ціли. Тіло стає при захованню чистоти кріпшим, бо весь запас відживляючих субстанцій зужитковує ся на потреби до-ростаючого організму. Тай ще треба й те знати, що полові зносини, розпочаті в дуже молодих літах перед 20-м роком життя, підкопують у високім степені здоров'я організму і смертність таких осіб значно більша, ніж тих осіб, що додержали своє тіло в половій чистоті поза 20 рік життя.

VIII. ПОЛОВІ (ВЕНЕРИЧНІ) НЕДУГИ.

Полові (венеричні) недуги, яких можна набрати ся підчас природного заспокоювання молодих почувань, є отсі: — 1) трипер; 2) твердий прищ (твердий шанкер) і загальний сіфіліс (улкус дурум ет сіфіліс конституціоналіс; 3) м'який прищ (м'який шанкер) (улкус молле); 4) запалення головки мужеського члена (баланітіс); 5) бородавковаті нарости (бородавки) на зовнішніх половых органах (кондиломата аккуміната). Крім того будемо говорити про 6) вуши на половых частях тіла (педікулі пубіс) і 7) коросту (скабі), бо ці два галапаси перехо-

дять дуже часто підчас полових зносин із особою зане-чищеною ними.

1. Трипер (*blenorhoe urethrae*).

Трипер є запаленєм слизної болони в мочовій цівці. Причиною трипра є мікроскопово малий галапас гонококкус (діплококкус Нейссері), який найлекше бачити в тільцях ропи, що випливає з мочової цівки, навіщеної трипром. Коли гонокок дістане ся із хорої похви жєнщини на злизну болону мочової цівки мужчини, то мужчина на разі не знає про те, аж за кілька днів, за тиждєнь, а часом ще довше стане він відчувати печенє в тій части мочової цівки, що називає ся лодковою (фосса навікуларіс), бо там задля розширєня мочової цівки гонокок найперше усадовлює ся і розмножує ся, приводячи слизну болону тоїж лодкової части в стан запалєня, то зн., що слизна болона червоніє, трошка запухає і болить, а підчас відпливу мочи печє, особливо з хвилею коли останні каплі мочи вийшли з мочової цівки викликує у хорого . почутє, що йому треба пускати моч, немов би мочовий міхур був повний. В дійсности однако в міхурі дуже мало мочи. Потреба частого випущуваня мочи тим більша і частійша, чим острійше запалєнє слизної болони в мочовій цівці і доходить нераз до того, що хорий мусить пускати моч що 10—15 мінут. А при тїм усе при останніх каплях мочи змагає ся печенє в лодковій части так значно, що хорі аж сичать із болю, тай затискають зуби. Моч, що в здоровім стані ясна, слабо жовтавої краски, стає каламутна, а коли ще ї трохи ясна, то плавають у ній нитки або клаптики слизи витворєної захорілою слизною болоною в мочовій цівці.

З лодкової части розширює ся гонокок дальше на слизну болону цілої цівки, хорий відчуває печенє в цілій мочовій цівці, хоч у меншій мірі. Однако печенє безустаннє, і тому воно впливає звичайно дуже пригноблюючо на загальний настрій хорого, якому нічо не милє.

Задля безупинного подразнення слизної болони в мочовій цівці приходить часто до подразнення полових органів взагалі, наступає ерекція мужеського члена, особливо в сні, а ерекція нераз получена з полюцією; як ерекція сама, так получена з полюцією, дуже болюча і заострює вже й так острый стан запалення слизної болони в мочовій цівці.

Коли трипер обмежить ся лишень на мочову цівку, то можна ще такий стан назвати менше шкідливим. Дуже часто однако розширює ся трипер і на інші части полових органів, або й цілого тіла, коли хорий недбалый, не лічить задля несвідомости або легковажить перестороги лікаря. Через те очевидно стає недуга що раз то більше зложеною (скомплікованою), а тимсамим щораз то тяжшою. Неодин думає, що трипер не грізна хвороба, що можна її легковажити, але така думка дуже хибна і приносить велику шкоду хорим на трипра. Се показуєть ся ясно, як узгляднить ся комплікації трипра, що виступають на жаль дуже часто при недбалости або несвідомости хорого. Трипер може перейти з мочної цівки до мочового міхура і викликає тут трипрове запалення слизної болони міхура. Моч стає ще більше каламутна, ніж при трипрі самої мочної цівки; міхур не може вдержати більшої кількості плинину і тому треба значно частійше пускати міч, як у здоровім стані. Коли хорий ще і з запаленням міхура заховує ся невідповідно, то пускає ся кров із запаленої слизної болони в мочовім міхурі, та кров застигає, а кусники застиглої крові можуть заткати частинно або й цілковито мочову цівку так, що взагалі не може вийти з міхура ні капля мочи. Се дуже болючі і прикрі обяви хвороби і тут не може обійти ся без лікарської помочи, бодай на те, щоби випустити моч із міхура.

З мочового міхура може трипер мандрувати в гору вздовж мочоводів (уретер) аж до нирок і викликати запалення як мочоводів, так і нирок. Се дуже тяжка комплікація трипра, бо грозить життю хорого.

З мочної цівки переходить трипер через провід сі-

мени (вас деференс) до яйця (тестікулус) і викликає запаленє сеї залози, і се дуже болюче так, що навіть найбільше терпеливі люди не в силі ходити, ані навіть стояти, але мусять спокійно лежати в ліжку. Запаленє яйця може бути по одній стороні, або й по обох сторонах рівночасно. Запаленє яйця робить найчастійше сю залозу неспосібною витворювати сімя і коли ціле яйце захоріло від трипра, то тим самим стає неплідним. Коли хорий перебув запаленє обох яєць так, що обі залози в цілости були хорі, то такий чоловік стає неплідним і не може мати дитий.

Перенесенє гонокока (трипрового гною, в якім гонокок гніздить ся) на злучницю ока дуже можливе через пальці самого хорого, коли він затре собі око трипровим гноєм, що випливає з мочевої цівки. Трипрове запаленє злучниці все дуже остре, а для ока в високім степені небезпечне, бо трипровий гній часто перегризає рогівку (корнеа), по чім око заходить більмом через витворенє шраму (цікатрікс) на місци рогівки. Досвід показує, що лишень одна третина трипрових запалень ока кінчить ся корисно для ока. Друга третина очий перебуває недуги з захованєм лише дуже малої бистроти зору, а дальша третина очий цілком сліпне.

Рівно тяжкою комплікацією трипра є т. зв. трипровий гостець (ревматизм) задля того, що гонококи переходять у кров, а з крові переходять на поверхні костий в сугавах. Трипровий гостець у сугавах остає дуже часто памяткою на ціле житє.

Коли трипер тріває довго, то приходить нераз до звуженя мочевої цівки (стріктура уретре). Очевидно, що звуженє з початку незначне і хорий може про те нічого не знати, але звуженє доходить нераз до того, що зовсім затикає ся мочова цівка і ані одна капля мочи не може вийти з мочевого міхуря. Конечним наслідком сього дуже прикрого, вельми болючого стану, є те, що моч пробиває собі нові отвори крізь стїну міхуря, або тої части мочевої цівки, що лежить межи міхуерм і зву-

женем цівки і тепер просякають мочею усі сусідні ткани, а дальше пробиває ся моч крізь шкіру на верх, на бедрах, животі, мошнях і т. д. Сей стан небезпечний для життя се дуже тяжка недуга, получена з високою горячкою, маяченням, утратою пам'яті і т. д.

Дуже небезпечною комплікацією трипра є трипрове запалення осердя (мішка з гладкої болони, що вистелює серцеві ями із середини (ендокардітис); при останній хворобі (ендокартїтис) можна навіть стратити життя, а що найменше полишає ся чоловік калікою на ціле життя, бо найчастійше наслідком сеї хвороби є хиба серця (віціум кордіс).

У женщин виступає заражене трипром найперше в похві через те, що гонокок переходить із хорого мужеського члена підчас полової злуки на слизну болону похви. З похви переходить трипер на мочову цівку і аж тепер стає він болючий для зараженої женщины. В дальшій перебігу переходить трипер на слизну болону матиці, відси на трубки “Фальльопія” де творять ся часто боляки, що руйнують сили і здоров'я женщины, спричинюють дуже довгі і болючі недуги, які можна усунути лишень тяжкими операціями.

З трубок “Фальльопія” може трипрове запалення перенестись на яєчники і на очеревну. Запалення очеревної болони є тяжкою недугою що часто кінчить ся смертю. Всі ті недуги бувають дуже часто причиною неплідности женщины. Замужні женщины заражують ся найчастійше від тих своїх мужів, які ломлять подружню віру, заражують ся самі у проститутток і переносять потім заражене на власну жінку. Таке поступоване мужчин признаємо за неморальне з етичного боку, а з уваги на знищене здоров'я власної жінки, зовсім невинної, що не прочуває ніякої біди, треба назвати таке поступоване мужів каригідним.

Такий образ трипра, представлений в головних рисах. Треба бути дуже упертим або дуже короткозорим, аби уважати трипра за легку хворобу. Противно! три-

пер дуже тяжка полова хвороба і небезпечна, може взагалі найтяжша зі всіх полових недуг.

Лічене трипра держить ся ось яких засад: на першій пляні — як при кожній хворобі — стоїть засада, що найліпше вистерігати ся зараження (профілаксіс). При трипі се можливе, коли взагалі уникає ся таких осіб другого пола, про які звісно, або бодай можна догадувати ся, що вони заражені тою хворобою.

Іншим способом є уживане охоронних предметів, якими є кондони. Кондон, се мішок, який є зроблений з тоненького кавчука, або з рибячої болонки і призначений на те, щоби його натягнути на мужеський член у стані напруження (ерекції) перед введенем до похви жінки. Тим осягає ся, що мужеський член зівсім не стикає ся з половими частинами жінки і задля того не може ввійти гонокок із можливо хорої похви на слизну болону мужеського члена. Теоритично сей спосіб добрий, але в практиці показують ся ось які недостачі: заложений кондон роздирає ся підчас наглого введення мужеського члена до похви або підчас руху, коли член уже в похві. Задля того може гонокок заразити слизну болону мочної цівки так, як би кондона не було. Кондон має дальше ту злу прикмету, що обнижає в значній мірі почуте приємности підчас полової злуки так, що не даром говорить ся про нього, що він є павутинем проти зараження а панциром проти розкоші.

Властиве лічене трипра жадає, щоби хорий заховував ся спокійно: найліпше лежати в ліжку, класти зимну воду, чи там лід на запалений мужеський член, на мочовий міхур, на яйця. Страви мають бути без дразливих приправ, як перець, паприка, хрін, гірчиця (муштарда); напитком одинока вода або молоко, сирватка, квас; зівсім шкідливо ділає алькоголь у всякій формі, як вино, пиво, рум, горівка, мід. Взагалі треба мало їсти, менше мяса, більше ярини.

Річю лікаря є означити, чи вільно уживати ліків, коли зачинати їх уживати і в якій формі.

При відповіднім ліченню і поведенню хорого на трипра можна вилічити ся за яких шість до вісім неділ. Одиноким мірилом, що трипер вилічений, є мікроскоповий розслід, чи в мочовій цівці ще є гонококи. Се може зробити лишень лікар. Очевидно, що яка небудь комплікація, або невідповідне заховане хорого продовжає слабкість на місяці і літа, часом робить чоловіка калікою на ціле жите, а часом накриє його і передчасною могилою.

2. Твердий прищ (твердий шанкер, *ulcus durum*) і сіфіліс (потеруха, пранці, франці *syphilis, lues*).

а). Твердий прищ.

Обі ті хвороби треба розбирати разом, бо сіфіліс є все конечним наслідком зараження твердим шанкром. Тому називаємо твердий прищ першорядним сіфілісом (сіфіліс прімарія), а загальний сіфіліс називаємо другорядним сіфілісом (сіфіліс секундарія ет тертіарія). Заражене твердим шанкром чи там заразком сіфіліса викликає мабуть властива мікроскопово маленька животи́на (мікроб), звана *spirochaete pallida*. Вона має форму прутика (палочки), позагинаного як коркотяг. Заражене настапує звичайно так, що до ранки, малої задирки на шкірі, випадкового обтертя шкірки білизною дістає ся заразок, коли діткне ся здрапане місце здорової особи з хорою частиною тіла (другої особи), спосібною до зараження. З того виходить, що заражене може наступити не лишень на полових органах мужчини та женщины, але може наступити і на позаполових частях тіла, як на пальцях, губах (устах), повіках, на шкірі грудних залозах, на очній галині і т. д. Заражене отже може бути на полових частях і на всяких інших частях тіла поза половими органами. Межи обома місцями зараження нема значнійшої різниці в розвою і наслідках хвороби.

Заражене полове відбуває ся ось як: Приймі́м, що женщина заражена на своїх полових органах або твер-

дим шанкром або прищем званим “конділома латум”, що є властивий для так званих другорядних об'явів сіфілістичних (про які буде мова низше). Оба ті прищі гноять ся а той гній (ропа, нарва) має в собі якраз сіфілістичний заразок. Коли мужчина сполучує ся полово з такою жінчиною, а на своїм мужеськім члені має десь задерту шкіру, або й здапає собі шкіру, чи там де сильнійше поранить ся підчас сполуки, то заразок із ропачого місця хорої жінчини має вигідний вступ до рани здорового мужчины, а з рани до лімфи тай до крові. Коли раз дістане ся заразок до лімфи або до крові, то в протягу дуже короткого часу дістає ся до загального круження крові і заражує цілий організм. Ніяке мите спостереженої ранки після полової сполуки (навіть дуже сильними десінфекційними плинами) не усуне заразка, не знівечить зараження, бо заразок уже далеко від місця входу, вже в цілім тілі.

Заражене неполове сіфілісом відбуває ся аналогічним способом. Візьмім, що хорий мужчина має сіфілістичний прищ другорядний на устах, або на язиці. Коли здоровий чоловік із потрісканими губами при цілованню діткне гноячої поверхні прища на устах хорого чоловіка, або ложки, склянки, і т. и., предметів, що перед хвилиною взяли на себе гній з прища сіфілітика, який мав ті предмети в ужитю, то заразок переходить у ранку здорового чоловіка там, де йому потріскали губи, і заражує його подібним способом як при зараженю половім.

По тім, як здоровий чоловік заразив ся сіфілістичним заразком, минає звичайно дві, три, аж до сімох неділь, а він чує ся все здоровим, бо незначне здапане по його мужеськім члені, на устах і т. д., загоїло ся без сліду. Нераз він і не спостеріг первісного здапаня. Сіфілістичний заразок потребує свого часу на се, щоби розвинути ся до такого степеня, аж своєю силою переможе цілий організм чоловіка. Потім часі хорий побачить, що без причини починає ярити ся те місце, де перед кількома неділями було незначне здапане, а потому на його

недовгу потіху загоїло ся без сліду. Анї мите, анї витиране очищуючими (десінфекційними) ліками не годно спинити, щоби прищ, (шанкер) не більшав, його дно не твердло, його поверхня не гноїла ся. Шанкер доходить у кількох днях до величини одного-двох сотиків, потиснений пальцями болють дуже мало і здає ся, немов би був з хрящки, від чого й походить його назва твердий прищ (шанкер, прищ). В сусідстві того місця, де наступило зараженє, напухають залози. Отже коли твердий прищ показав ся на устах, то напухають залози на шиї, колиж твердий прищ розвиває ся на мужеськім члені, то набігають залози в пахвинах і то значнійше по тім боці, де лежить твердий прищ, але вони болять дуже мало, — і се властиве для сіфілістичного опухнення залоз, що вони не болючі, коли навпаки опухнення пр. задля занечищених ран іншої (не сіфілістичної) природи на ногах і т. д. бувають дуже болючі.

б). Другорядні сіфілістичні об'яви.

Без огляду на те, чи твердий прищ під впливом лічення, загоїть ся, чи ні, виступають дальші об'яви сіфілістичного зараженя цілого організму, а ті об'яви називаємо другорядними сіфілістичними об'явами. За які два місяці після того як показав ся твердий прищ, виступає по цілім тілі на шкірі сіфілістична осипка (ексантема сіфілістікум) у виді червоних, плям різної величини, таких, як зерно проса, аж до таких як двосотикова монета або й ще більших. Нераз являють ся замість плям прищики різної величини, знов показують ся трохи більші прищі, що гноять ся, а той гній засихає і покриває прищі струпами. Нераз усі ті форми стоять одна попри другу на шкірі хорого. Підчас осипки виступає звичайно горячка і триває кілька днів, а її супроводить біль голови, брак апетиту, загальна утома і т. д. Тим часом понапухали майже всі лімфатичні залози в пахвинах, на шиї, під долішною вилицею, коло ліктів і т. д. Всі ті залози почали

були пухнути вже в хвилі появи первісного твердого прища. Рівночасно з осипкою починає звичайно боліти горло; воно почервоніло й запухло, а на мікдалках виступають звичайно біляві плями. Сі прищі властиві другорядному сіфілісови можуть появи́ти ся на слизній болоні устної ями, в кутиках уст, на язиці. На шкірі при вході до відходової кишки, на мошнах у мужчин, на полових губах у женщин появляються подібні гноячі прищі і називаються “конділомата лата”. Всі ці гноячі прищі другорядного сіфіліса містять у своїй ропі (гною, нарві) сіфілістичний заразок, спосібний заразити здорового чоловіка. Підчас того як виступають другорядні обяви сіфілістичні, розвиває ся в тілі значна неокровність і хорий виглядає звичайно дуже блідий.

Дальший розвій сіфілістичного зараження залежить від лічення. Коли хорий задля несвідомости або задля недбальства не лічить ся, то хід недуги буває ось який: — первісний прищ може загоїти ся і без лічення за яких сім до чотирнайцять днів. Але без лічення не уступає побільшене (запухнене) лімфатичних залоз, другорядні прищі на шкірі і слизних болонах горла, носа, устної ями і т. д. На очах виступає запаленє дугівки, зорового нерву і т. д. Всі отсі обяви розвиваються в протягу кільканайцятьох місяців — і їх називаємо другорядними обявами сіфілістичними.

в). Третьорядні обяви сіфілістичні.

Є ще й третьорядні обяви сіфілістичні. Вони не відграничені остро від другорядних, але творять осібну групу через те, що являються пізнійше по описаних висше, другорядних обявах. Характеристичною прикметою треторядного сіфіліса є витворюване запальних гузів т. зв. гуматів, які не раз гноять ся і розпадаються. Той розпад не держить ся на поверхні сіфілістичного гуза, але йде і в глѳб і доходить до того, що пр. стіна (межи лівою і правою половиною) носа вигниває, а в стіні повстає ді-

ра; може бути й те, що м'яке піднебіє вигниває, що тверде (кістне) піднебіє порозділює ся так, що задля того ті сифілістики говорять вугнаво. До третьорядних об'явів сифілістичних зачисляємо сифілістичне запалення окостних болон, сифілістичні запалення печінки, легких, серця, мозку і т. д. Одним словом, нема в людському тілі такого органу або його частини, що була би безпечна перед сифілісом. Є се дуже тяжкі недуги, а важність їх залежить просто від важности дотичного органу (як серце мозок) для людського життя. Сифіліс вважає ся також причиною так званого розм'ягчення мозку, і висихання хребетного мозку, а се хвороби смертельні.

Всім тим тяжким недугам і то, як ми бачили, всіх можливих органів людського тіла, згідно великим спустошенням у тих органах, запобігає успішно розумне, умітне лічення, переведене в свій час. Сифіліс є тяжкою недугою, але при розумнім ліченні можна хорого цілковито вилічити так, що не лишить ся з неї ні сліду в тілі хорого сифілістика — і се є нагородою для лікаря і для хорого за довгий і мозольний труд підчас лічення. Властивим, (специфічним) ліком на сифіліс є ртуть (живе срібло) у різних хемічних формах і йод. Се вже діло лікаря вибрати форму ліка, означити його скількість і означити час як довго треба уживати тих ліків, щоби цілковито подужати.

3. М'який прищ (м'який шанкер, *ulcus molle*).

М'який прищ (шанкер) є заразливою недугою, викликаною мікробами; їдь його містить ся в ропі гноячого м'якого прища і заражує здорового чоловіка або жінку тим способом, що входить в рану, хочаби й дуже маленьку, яка повстала через драпанє, обтертє шкіри і т. д. Спосіб зараження зовсім подібний, як при зараженні твердим прищем (сифілісом). Велика різниця межи твердим і м'яким прищем (шанкром) лежить у тім, що твердий прищ є загальною (конституціональною) хворобою, яка

розходить ся по цілім тілі, коли навпаки мягкий прищ є місцевою (льокальною) недугою, ограниченою лиш до того місця, яке занедужало; значить, коли мягкий прищ загоїть ся, то на тім уже й кінець хороби. З хвилею появи того прища (шанкра) дуже тяжко осудити на певно, чи має ся діло з мягким, чи твердим прищем; навіть досвідчений лікар не зуміє нераз порішити се важне питанє, хиба аж по довшім вижиданю. Загально беручи ріжниця тих недуг лежить у тім, що мягкий прищ, коли його стискає ся пальцями, видає ся мякшим, ніж твердий; а дальше в тім, що мягких прищів може бути й кілька нараз, коли противно твердий прищ найчастійше лиш один. Також і в тім ріжниця, що залози в пахвинах, опухаючи при мягкім прищи, болючі, дуже часто загноюють ся, творять великі і болючі боляки (бубо), які дальше лускають і з них виливається ся багато нарви (гною), коли противно при твердім прищи опухненє залоз у пахвинах доходить до меншого степеня, неболюче і опухлі залози ніколи не загноюють ся. Розріжненє тих обох прищів часом іще й тому не можливе, що оба зараженя, і мягким і твердим прищем, можуть виступити рівночасно. Тоді очевидно кождий прищ для себе має свій властивий хробливий розвій.

Мягкий прищ може загоїти ся за 4—5 неділь. Лічєнє змряє до того, щоби прищ удержати можливо в чистім стані при помочи десінфекційних ліків, а надто недопустити до витвореня боляків (бубонів), що повстають звичайно при значнім гноєню мягкого прища тай неспокійнім захованю хорого. Коли вже стала червоніти шкіра понад спухлими залозами в пахвинах, треба конечно лежати в ліжку, прикладати зимну воду або лід, а коли боляки наповнили ся нарвою (гноєм), треба їх розтяти ножем і лічити так як хірург. З того ясно кождому, що бубони є дуже непожаданою комплікацією прища, бо ціла недуга стає через те довгою і приковує хорого до ліжка.

Ще прикрійшими бувають комплікації мягкого при-

ща: — 1) коли виступає завмиранє ткани в сусідстві мягкого прища так, що цілу хоробу називаємо *ulcus molle gangraenosum*, і 2) коли мягкий прищ показує наклін що раз дальше розширяти ся і займати сусідну шкіру, підчас коли перші хорі місця гоять ся і покривають ся шрамами. Сей рід мягкого прища називає ся *ulcus molle serpiginosum* (мягкий прищ повзаючий); він може тревати навіть кілька або й кільканайцять місяців.

4. Запаленє головки мужеського члена (*balanitis*).

Головка (жолудь) мужеського члена покрита у новонародженої дитини залупою. Але підчас полового дозрівання показує ся природна потреба залупити мужеський член, то зн. відтягати залупу з головки в зад так, щоби головка обнажила ся. Діє ся се, через напруженє (ерекцію) мужеського члена, при чім головка неначе висуває ся з під залупи. Коли залупа на переді звужена так, що не може відтягнути ся, то під нею назбирає ся доволі лойоватої маси, або нераз занечищує ся головка під залупою трипровим гноем і від того всього пухне, червоніє і стає болючою шкіра головки, а сей стан називаємо запаленєм головки. В горячі часи в літі в горячих землях, як Арабія, Палестина, виступає се запаленє частійше ніж у зимі або в зимних краях. Тому то заведено у народів у горячім підсоню, як у Жидів, Негрів в Африці, Мексиканців і інших, звичай обрізувати залупу у новонагоджених дїтий, а те “обрізанє” відбувало ся й відбуває ся ще й нині як складова часть ретуалу відповідної віри. По “обрізаню” стає головка ціле жите непокрита залупою і через те стає неможливим, аби на головці задержав ся довший час трипровий гній в такій кількості, щоби від того могла запалити ся шкіра головки.

Ліченє запаленя головки члена має головно на меті очищенє захорілої части. Коли залупа доволі широка і дасть ся легко відтягнути, то вистарчить уже саме зми- ванє чистою перевареною водою і сухе удержуванє хо-

рої часті. Колиж залупа звужена, то треба усунути звуженє через розрізанє залупи (не “обрізанє”). Очевидно, що се може зробити лише лікар.

5. Бородавковаті нарости на половых частях тіла (*condylomata accuminata*).

Бородавковаті нарости виростають часом у мушин на головці члена, особливо по обох боках привязки залупи і в ровику поза головкою, а у жінщини у вході до похви навіть серед звичайних відносин, лишень задля нечистого удержування половых органів. Найчастійше причиною великого розросту бородавок на половых органах є безнастанне подразнюванє гноем із довготривалої трипрової недуги. З тих бородавковатих наростів пускає ся легко кров, особливо підчас половых зносин, а при тім виступає біль у міру того, чим більше бородавок і чим більше вони вирости. Щоби їх позбути ся, треба їх видрапати острою ложкою, випалити ляпісом і треба утримувати головку члена чисто; інакше вони відрастають. Драпанє і випалюванє — се виключно діло лікаря.

6. Вуши (*pediculi pubis*).

Кругом половых органів розводять ся часто вуши, відмінної породи від вуший звичайних на одію. Вуший можна набрати ся від другого, коли вони на ній уже є, а про се не тяжко підчас половых зносин. Вуши розсїдають ся в волосю на половых органах, а коли їх довший час полишить ся в спокою, то вони розлазять ся і на волосє під пахами і на брови. Вуши є причиною, що шкіра свербить на тім місци, де вони розвели ся і чоловік мусить безнастанно чіхати ся і драпати ся. Через драпанє повстає по цілім тілі багато прищів, що ще збільшають сверблячку. Вуши з товариських зглядів не менше прикрі, як сверблячка і прищі.

Звичайно вистарчить один раз намазати всі завушені

місця шарою мастию (*unguentum hydrargyri cinereum*), зробленою з ртуті і товщу, щоби вигубити всі вуши і очистити шкіру. Треба втирати бодай чверть години; а взяти до того 5—10 грамів шарої масти. За добу треба взяти теплу купіль і обмити тіло від масти і убитих вуши.

7. Короста (*scabies*).


Короста се галапас, подібний як вош, але значно менший. Короста вкопуєть ся під пришкірок особливо на тих місцях, де творять ся фалди шкіри, бо там їй теплійше. Отже: межі пальцями на руках, на мошнах, на мужеськім члені здовж пояса, де одіне все сильнійше притиснене до тіла і т. д. Підчас полових зносин із особою, що має коросту, переходить короста з її полових органів на полові органи здорової особи, вдирає ся під пришкірок і спричиняє велику сверблячку, більшу вночі, ніж у день, бо вночі огріває ся тіло під покривалом у ліжку, а в теплі короста успішнійше розвиває ся під пришкірком.

Коросту можна вигубити стираксовою мастию; масти тої треба на один раз ужити 50—100 грамів, а втирати треба енергічнійше і довше (45—60 минут), чим при вушах, щоби масть зайшла під пришкірок. По добі треба взяти легку купіль, треба перемінити біле на собі і на ліжку, а коли сверблячка не уступила цілковито, то треба за кілька днів натиранє повторити. Стираксова живица, якої вживають до приготування масти, має властивий запах, для деяких осіб дуже немилий.

ЗАКІНЧЕНЄ.

Із того, що було сказано, слідує, що довго управляна онанія нищить здоровле безповоротно, а знов заразливі хвороби полові, трипер і твердий прищ (шанкер) зі своїм конечним наслідком загального сіфіліса, є великим нещастєм для кожного, хто заразить ся одною з недуг.

Не тому нещастем, немов би сі хороби приносили нечесть, бо в очах лікаря кождий хорий є лише хорим чоловіком, що потребує помочи, але нещастем тому, бо трипер і сіфіліс є в силі при неприязних відносинах знищити здоровле чоловіка, хоча би він був до тепер найздоровіший. Зі знищенням здоровля нищить ся й ціле щастє чоловіка, бо хто неспосібний до праці, той неспосібний до повного житя, зложеного як-раз із розумного поділу між тілесну й духову працю тай розривку. Велич нещастя оцінить у повній мірі лише той, хто вже утратив здоровле. І жаль великий, що чужа втрата має за мало поучаючої сили для одиниці з повним здоровлем. Хто втратив здоровле і мусів зречи ся дуже вчасно тих житєвих замірів, які снував у своїй молодечій уяві, той признасть слушність реченя, що хвиля перелетної розкоші, при чім набавив ся тяжкої заразливої хороби, не стоїть у ніякім відношеню до тої втрати, яку поніс рівночасно; і признасть певно, що труд понесений при захованю цілковитої чистоти тіла, є дрібницею проти тих мук тіла, а ще більше душі, яких приходить ся зазнати кождому, хто стоїть під впливом переконання, що утратив безповоротно своє кріпке здоровле. Бо хоча і вилічить ся, то всеж воно не буде те первісне, непорочне здоровле, але латане.



З М І С Т.

I. Анатомія полових частий тіла	5
II. Фізіологія полових частий тіла	21
III. Полова зрілість	28
IV. Неприродне заспокоюване полового гону	31
V. Наслідки онанії	33
VI. Лічене онанії	36
VII. Природні полові зносини	39
VIII. Полові (венеричні) недуги	45
1. Трипер	46
2. Твердий прищ (шанкер) і сифіліс	51
3. М'який прищ (шанкер)	55
4. Запалені головки мужеського члена	57
5. Бородавковаті нарости на полових частях тіла	58
6. Вуши	58
7. Короста	59
Закінчене	59

Купіть Собі Велику Ілюстровану Книжку

„ГЕРОЙСЬКА УКРАЇНА“

В якій знайдете дуже гарні фотографічні образи і описи:

Українського війська, Січових Стрільців, Українських повстанців, Галицької (укр.) армії, Українських провідників, отаманів, полковників, офіцерів, діячів, як Вітовський Петлюра, Петрушевич, Винниченко, Грушевський, Мазепа, Мартос, і багато других українських діячів, які брали живу участь в українській боротьбі за свою державу і народ.

Під зглядом артистичного виконання і красоти "Геройської України", запевняємо що се найкрасший і найбільший ілюстрований альбом українських героїв з нашої воєнної доби за роки: 1914—1920.

Кожда українська родина, кожде українське товариство, кождий грамотний Українець в Канаді і Америці повинен мати сю велику ілюстровану книжку у себе. Крім образків автор книжки д. Осип Меґас подає в ній короткі записки і спомини зі свого побуту на Україні.

ЦІНА КНИЖКИ \$1.50.

Ukrainska Knyharnia

850 Main Street.

Winnipeg, Man.

НЕЧУВАНЕ


НЕЧУВАНЕ

ПОЛЬСЬКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО В СХІДНІЙ ГАЛИЧИНІ.

СКОНФІСКУВАЛО І ЗАБОРОНИЛО

книжку

„ТРАГЕДІЯ ГАЛИЦЬКОЇ УКРАЇНИ“



Правдивий опис як Ляхи вбивали, мордували, знущалися над нашими батьками, братами, сестрами, як нищили, рабували і палли їхнє добро і про всі інші вчинки Ляхо-Татарів довідастеся з книжки що тепер вийшла з друку під заголовком: —

ТРАГЕДІЯ ГАЛИЦЬКОЇ УКРАЇНИ

260 сторін, з образками і гербом України лише \$1,00.

ЗМІСТ КНИЖКИ:

1. Нечувані, прямо потрясаючі звірства польського війська на галицькій Україні.
2. Арештованя, знущання, терор над українським населенням Сх. Галичини;
3. Крадежі, грабежі, і реквізиції польських ГУНІВ-ТАТАР в Сх. Галичині;
4. Страшні описи розстрілювань вагітних жінок і сивоволосих старців, палене домів з маленькими дітьми;
5. Варварські катованя українських полонених і інтернованих по таборах Домбя, Стшалкової, Бересть Литовська, Пікулич, Бригідок, де Поляки випроводили на другий світ понад 40,000 цвіту українського народу нарочним ширенем тифусу, червінки, других пошестей, як також голодом.
6. Як виглядає в практиці мандаторське право дане Вільсоном, Лойд Джорджем і Клеменсом Польщі над Східною Галичиною?
7. Як виглядає тепер наше колись процвітаюче шкільництво в Галичині;
8. Оплаканий економічний і політичний стан Східної Галицької України.

— Ціна лиш один долар. —

Львівська часопись »Вперед« у 161 числі, з 15 липня подає слідує:

»Генеральний делегат зарядив відбання дебіту ілюстрованій українській брошурці під наголовком »Трагедія Галицької України.« Точний польських звірств у Східній Галичині.»

UKRAINSKA KNYHARNIA

848-850-852 Main Street.

Winnipeg, Man.

**КОЖДИЙ СВІДОМИЙ УКРАЇНЕЦЬ І УКРАЇНКА ПОВИННІ ЗНАТИ
ІСТОРІЮ СВОЄЇ ВІТЧИНИ**

**ЧИТАЙТЕ ІСТОРІЮ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДА НАПИСАНУ
ПРОФЕСОРОМ ГРУШЕВСЬКИМ.**

Кождий свідомий Українець мусить мати в своїй хаті сю книгу!!

ІЛЮСТРОВАНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Друге нове доповнене видане

Велика і для всіх зрозуміло написана, багато ілюстрована. Кождий освічений нарід, що живе своїм власним національним і культурним житєм, не тільки має минувшину але і знає її. В сій книзі в перше представлено всесторонно минуле життя нашого народу.

Автор професор **МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ** не тільки знає факти, В сій книзі вперше представлено всесторонно минуле життя йому живих барв силою свого внутрішнього чуття.

"ІСТОРІЯ УКРАЇНИ"

се дійсно величний дарунок українській суспільности, велична і неминуча вкладка в нашу національну скарбницю.

Історія Проф. М. Грушевського славить ся своєю популярністю в старім краю, а на доказ нехай послужить се, що другий наклад тої книжки був вичерпаний ще перед вибухом війни. Історія України друкована на гарнім папері, обнімає 516 сторін друку, 416 історичних образків, великого формату, в 6-тьох частих. —

Брошурована \$2.50
В гарній міцній оправі \$3.25

ПРО СТАРІ ЧАСИ НА УКРАЇНІ. — М. ГРУШЕВСЬКИЙ.

Знаменито і приступно написана коротка Історія України. Написав її найбільший український історик, мученик за українську справу, бувший професор львівського університету Михайло Грушевський. В книжці є 38 образків і мапа України, 144 сторін друку. — Ціна 40ц

ОБРАЗКИ З ГРОМАДЯНСЬКОГО І ПИСЬМЕНСЬКОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНЦІВ В 60 РР. XIX СТ.

В двох частих. З 10 портретами і 2 малюнками. О. Барвінського. Незвичайно інтересні й цікаві спомини автора з епохи національного розвитку. Спомини переплітані листами М. Лисенка і Н. Куліша. У двох частих. — Ціна \$1.50

UKRAINSKA KNYHARNIA
850 Main St. Winnipeg, Man.